

УДК 597.08

ИХТИОФАУНА ПРЕСНЫХ И СОЛОНОВАТЫХ ВОД РОССИИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ: АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК С ТАКСОНОМИЧЕСКИМИ КОММЕНТАРИЯМИ. 2. ОТРЯД CYPRINIFORMES, ПОДОТРЯДЫ CATOSTOMOIDEI, COBITOIDEI И CYPRINOIDEI[#]

© 2023 г. Ю. В. Дылдин^{1, *}, А. М. Орлов^{1, 2, 3, 4, 5}, Л. Ганель⁶,
В. И. Романов¹, Р. Фрике⁷, Е. Д. Васильева⁸

¹Томский государственный университет – ТГУ, Томск, Россия

²Институт океанологии РАН – ИО РАН, Москва, Россия

³Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН – ПИБР ДФИЦ, Махачкала, Россия

⁴Институт проблем экологии и эволюции РАН – ИПЭЭ РАН, Москва, Россия

⁵Дагестанский государственный университет – ДГУ, Махачкала, Россия

⁶Карлов университет в Праге, Прага, Чешская Республика

⁷Государственный музей естествознания Штутгарта, Штутгарт, Германия

⁸Зоологический музей Московского государственного университета – ЗММУ, Москва, Россия

*E-mail: yurydyldin@gmail.com

Поступила в редакцию 24.11.2022 г.

После доработки 06.01.2023 г.

Принята к публикации 12.01.2023 г.

Вторая часть работы является продолжением нашей серии публикаций, стартовавшей в 2022 году. В данную работу мы включили всех известных представителей отряда Cypriniformes, встречающихся в России и на прилегающих территориях. Отряд карпообразных рыб представлен здесь тремя подотрядами: Catostomoidei, Cobitoidei и Cyprinoidei, включающими 10 семейств, 64 рода и 177 видов. Из всех семейств наиболее многочисленными оказались Leuciscidae (59 видов/33.3% по отношению ко всем видам), Gobionidae (35/19.8%) and Xenocyprididae (23/13.0%), что в совокупности составляет чуть более 66%. Из изучаемых видов 14 являются интродуцентами и никогда не были нативными, что составляет 7.9% от всех карпообразных России; к эндемикам относится 21 вид (11.9%). В отличие от всех ранних аннотированных сводок и монографий в нашей работе впервые для ихтиофауны России указаны 32 вида (18.1%). По отношению к среде обитания 131 вид встречается и обитает исключительно в пресных водах, 31 вид имеет пресноводное происхождение, но может встречаться и в слегка солоноватых водах, десять видов представлены анадромными (проходными) формами (все имеют жилые формы) и три вида – амфидромные, способные жить и размножаться как в солоноватых, так и в пресных водах. Было выявлено, что, согласно критериям Международного союза охраны природы, основная масса рыб (135/76.3%) относится к категории, “вызывающей наименьшее беспокойство, и только два вида – *Cobitis taurica* и *Gobio tauricus* – отнесены к категории “находящихся под угрозой исчезновения”.

Ключевые слова: карпообразные, таксономический обзор, промысловое значение, природоохран-
ный статус, пресноводные, Россия.

DOI: 10.31857/S0042875223040069, EDN: RNEPWU

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.