

УДК 597.08

ПЕРЕОПИСАНИЕ ОБЫЧНОЙ, НО СЛАБО ИЗУЧЕННОЙ КАРЛИКОВОЙ ПИРАНЬИ *SERRASALMUS HOLLANDI* (SERRASALMIDAE) ИЗ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ МАДЕЙРА[#]

© 2023 г. Ф. Гайо-Кардосо^{1, *}, М. Кареага^{1, 2}, Ф. М. Карвахаль-Вайехо¹

¹Университет майора Сан-Симона, Кочабамба, Боливия

²Музей естественной истории Альсида д'Орбиньи, Кочабамба, Боливия

*E-mail: flagallocalar1@gmail.com

Поступила в редакцию 06.02.2023 г.

После доработки 31.05.2023 г.

Принята к публикации 02.06.2023 г.

Карликовая пиранья *Serrasalmus hollandi* была описана в 1915 г. Эйгенманом на основе единственного экземпляра из бассейна верхней части реки Мадейра на юго-западе Амазонки, голотип был позже утерян. Поскольку в описании отсутствовали вариации морфологических признаков, идентификация вида была несколько затруднена. Ошибочное отождествление этого вида с другим малоизученным, но морфологически сходным *S. eigenmanni*, возможно, было обычным явлением в ихтиологических сводках. Последний из двух упоминаемых видов был описан Норманом в 1929 г. на основе единственного экземпляра из реки Эссекибо, нижнее течение которого находится в Гвианском нагорье к северо-востоку от бассейна Амазонки. В настоящем сообщении на основе морфологических данных и генетической информации (локус *COI* митохондриальной ДНК) приводится переописание *S. hollandi* – вида, широко известного в бассейне реки Итенес в Боливии. Неотип был выделен по экземпляру из реки Парагуа, притока реки Итенес, недалеко от типового местообитания. Представлен диагноз для дифференциации *S. hollandi*, *S. eigenmanni* и видов, зарегистрированных в Боливии в бассейнах Амазонки и Ла-Платы.

Ключевые слова: боливийская Амазонка, река Итенес, Гуапоре, река Парагуа, неотип, *Serrasalmus eigenmanni*.

DOI: 10.31857/S0042875223060073, **EDN:** ARIEXA

[#] Полностью статья опубликована в английской версии журнала.