УДК 541.6; 541.49; 54.057; 544.176

СИНТЕЗ НОВОГО КОМПЛЕКСА КОБАЛЬТА С ДИГИДРОКСИКУМАРИНОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЕГО РЕДОКС-АКТИВИРУЕМОЙ ДИССОЦИИ

© 2024 г. К. А. Спиридонов^{1,2}, И. А. Никовский², Е. П. Антошкина^{2,3},
Е. А. Хакина^{2,*}, Ю. В. Нелюбина²

¹Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

²Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

³Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный,
Московская область, Россия

*e-mail: khakina90@ineos.ac.ru

Поступила в редакцию 04.05.2023 г.

После доработки 14.06.2023 г.

Принята к публикации 19.06.2023 г.

Синтезирован новый редокс-активный комплекс кобальта(III), содержащий 2-оксо-2*H*-хромен-6,7-диолат дианион и 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридин в качестве лигандов. С помощью спектроскопии ЯМР *in situ* исследовано восстановление синтезированного комплекса аскорбиновой кислотой в инертной атмосфере. Показано, что восстановление приводит к высвобождению 6,7-дигидроксикумарина, выступающего в качестве модельного лекарственного препарата. Данный процесс имеет первый порядок по исходному комплексу.

Ключевые слова: *in situ* спектроскопия ядерного магнитного резонанса, дигидроксикумарин, комплексы кобальта, редокс-активируемая доставка лекарственных препаратов

DOI: 10.31857/S0132344X24030059 EDN: NSJRPD

Злокачественные солидные опухоли представляют большую проблему в клинической практике, так как они неэффективно поддаются радио- или химиотерапии из-за гипоксии в опухолевых тканях [1, 2]. Однако дифференциация здоровых и опухолевых тканей по уровню кислорода делает возможной редокс-активируемую доставку молекул лекарственных препаратов целенаправленно в клетки опухоли [3, 4]. При этом повышается эффективность терапевтического действия препарата и уменьшается выраженность его побочных эффектов.

Комплексы металлов активно исследуются в качестве “молекулярных платформ” для адресной доставки молекул противораковых препаратов в клетки опухолей [5]. Особый интерес с этой точки зрения представляют комплексы кобальта. Кобальт является биогенным металлом, который входит в состав витамина B₁₂. Комплексы кобальта(III) отличаются достаточно большой константой устойчивости, что обеспечивает их инертность при попадании в организм [6]. Правильный подбор лигандов позволяет получать комплексы, окислительно-восстановительный

потенциал Co(III)/Co(II) которых лежит в диапазоне потенциалов биологических внутриклеточных восстановителей [7]. Комплексы кобальта(II), образующиеся при восстановлении, способны к элиминированию одного из лигандов [6]. Эта стадия как раз и приводит к высвобождению молекулы лекарственного препарата. Кроме того, восстановление иона кобальта приводит к резкому изменению его магнитных свойств: переход Co(III)/Co(II) сопровождается образованием парамагнитного иона кобальта, что делает возможным отслеживание высвобождения лекарственного препарата с помощью МРТ [8].

На данный момент в качестве потенциальных “молекулярных платформ” для адресной доставки лекарственных препаратов в клетки опухолей изучено множество комплексов кобальта с различными лигандами и получен ряд обнадеживающих результатов [9]. Например, комплекс кобальта(III), содержащий две молекулы 2,2'-бипиридина и 6,7-дигидроксикумарин, проявляет цитотоксичность по отношению к клеткам рака кишечника в условиях гипоксии [7]. Однако до сих пор не удалось довести стратегию редокс-ак-

тивации до стадии клинических испытаний. Одна из основных проблем заключается в невозможности воспроизведения результатов, полученных *in vitro*, на моделях *in vivo*. Это делает необходимым проведение систематических исследований по установлению закономерностей процесса редокс-активации для дальнейшей оптимизации “молекулярных платформ” на основе комплексов кобальта.

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на терапевтический эффект при доставке лекарств с помощью “молекулярных платформ”, является скорость восстановления иона кобальта в комплексе и последующего высвобождения лекарственного препарата. Если восстановление протекает слишком медленно, есть риск, что комплекс будет выведен из организма до того, как достаточное количество лекарственного препарата будет высвобождено в клетки опухоли. Известно, что заместители в ароматической системе лигандов влияют на энергию молекулярных орбиталей комплексов и, как следствие, на их окислительно-восстановительный потенциал [10]. Однако в литературе отсутствуют систематические исследования того, как введение заместителей в кольцо 2,2'-бипиридина влияет на свойства комплексов кобальта(III) и кинетику высвобождения лекарственного препарата, хотя такие исследования могли бы выявить закономерности, необходимые для рационального дизайна редокс-активируемых комплексов для адресной доставки лекарств.

Ранее нами был предложен подход, позволяющий осуществлять мониторинг процессов редокс-активации лекарственных препаратов в комплексах кобальта(III) *in situ* с помощью спектроскопии ЯМР. Это позволило нам изучить восстановление аскорбиновой кислотой гетеролептических комплексов кобальта(III), содержащих в качестве лигандов 2,2'-бипиридин или 1,10-фенантролин и 2-оксо-2*H*-хромен-6,7-дио-

лат дианион [11], и обнаружить, что комплекс с фенантролином восстанавливается значительно быстрее.

В настоящей работе нами синтезирован новый редокс-активный комплекс кобальта(III) [Co(BipyOMe)₂(esc)]ClO₄ (I), содержащий в качестве лигандов 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридин и 2-оксо-2*H*-хромен-6,7-диолат дианион (схема 1), и исследовано его восстановление аскорбиновой кислотой *in situ* с помощью спектроскопии ЯМР.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве предшественника для синтеза комплекса кобальта I использовали комплекс кобальта(III) [Co(BipyOMe)₂Cl₂]Cl, полученный при окислении соответствующего комплекса кобальта(II) газообразным хлором [12]. Хлор получали при взаимодействии перманганата калия с концентрированной соляной кислотой и осушали пропусканием через концентрированную серную кислоту [13]. Коммерчески доступные 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридин (97%, Sigma-Aldrich), гексагидрат хлорида кобальта(II) (98%, Sigma-Aldrich), 6,7-дигидроксикумарин (98%, Sigma-Aldrich), перхлорат лития (98%, Alfa Aesar), триэтиламин (99%, Sigma-Aldrich) использовали без предварительной очистки.

Синтез комплекса [Co(BipyOMe)₂Cl₂]Cl. К раствору 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридина (1.681 ммоль, 363 мг) в метаноле добавляли раствор гексагидрата хлорида кобальта(II) (0.84 ммоль, 200 мг) в 10 мл метанола. Полученную смесь кипятили в течение 2 ч. За это время цвет раствора изменялся с желтого на красно-коричневый. Затем реакционную смесь охлаждали до комнатной температуры и барботировали через нее газообразный хлор, полученный при взаимодействии перманганата калия с концентрированной соляной кислотой. При этом целевой комплекс образовывался в виде кристаллического зеленого

Схема 1.

осадка. Осадок отделяли фильтрованием, промывали этанолом и высушивали в вакууме. Выход — 362 мг (72%).

ЯМР ^1H (CD_3OD ; 300 МГц; δ , м.д.): 9.63 (д., $J = 6.9$ Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 8.34 (д., $J = 2.6$ Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 8.16 (д., $J = 2.6$ Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 7.64 (д.д., $J = 6.9$, 2.6 Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 7.21—6.92 (м., 4H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 4.21 (с., 6H, OCH_3), 3.98 (с., 6H, OCH_3).

Масс-спектр (ESI), m/z : $[\text{Co}(\text{VipyOMe})_2\text{Cl}_2]^+$, рассчитано — 561.1, найдено — 560.9.

Синтез комплекса $[\text{Co}(\text{VipyOMe})_2(\text{esc})]\text{ClO}_4$ (I). Раствор 6,7-дигидроксикумарина (0.5 ммоль, 89 мг) и триэтиламина (1 ммоль, 10.2 мг, 139 мкл) в 10 мл метанола добавляли к раствору $[\text{Co}(\text{VipyOMe})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$ (0.5 ммоль, 299 мг) в 15 мл метанола. Полученную смесь кипятили в течение 3 ч, затем охлаждали до комнатной температуры, добавляли раствор перхлората лития (1.25 ммоль, 133 мг) в 5 мл метанола и перемешивали 30 мин при охлаждении на водяной бане для кристаллизации целевого комплекса. Образовавшийся зеленый осадок отделяли фильтрованием, промывали изопропанолом, диэтиловым эфиром и высушивали при пониженном давлении. Выход — 249 мг (65%).

ЯМР ^1H (DMCO-d_6 ; 400 МГц; δ , м.д.): 8.59 (уш.с., 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 8.50 (д.д., $J = 42.0$, 6.6 Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 8.49 (д., $J = 6.8$ Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 7.65—7.59 (м., 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 7.57 (д., $J = 9.3$ Гц, 1H, $\text{C}\underline{\text{H}}\text{CHCOO}$), 7.32 (д.д., $J = 33.9$, 6.4 Гц, 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 7.17—7.10 (м., 2H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 6.55 (с., 1H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 6.41 (с., 1H, $\text{C}\underline{\text{H}}$), 5.82 (д., $J = 9.3$ Гц, 1H, $\text{CHC}\underline{\text{H}}\text{COO}$), 4.12 (с., 6H, OCH_3), 4.02 (с., 6H, OCH_3).

ЯМР ^{13}C (DMCO-d_6 ; 101 МГц; δ , м.д.): 170.07, 170.00, 169.47, 169.45, 167.89, 161.83, 158.77, 157.88, 157.84, 157.82, 152.54, 152.48, 150.63, 150.61, 149.25, 144.69, 114.79, 114.76, 114.66, 112.47, 112.46, 111.50, 110.01, 109.49, 107.58, 102.45, 57.81, 57.73.

Масс-спектр (ESI), m/z : $[\text{Co}(\text{VipyOMe})_2(\text{esc})]^+$, рассчитано — 667.1, найдено — 667.3.

Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C комплексов кобальта регистрировали для растворов в дейтерированных метаноле и диметилсульфоксиде с использованием спектрометров ЯМР Bruker Avance 300 и Varian Inova 400 с рабочей частотой для протонов 300.15 и 400.13 МГц соответственно. Значения химических сдвигов определяли относительно

сигналов остаточных протонов растворителей (^1H 2.50 м.д., ^{13}C 39.52 м.д. для DMCO-d_6 ; ^1H 3.31 м.д., ^{13}C 49.0 м.д. для CD_3OD).

Масс-спектрометрический анализ комплексов кобальта и продуктов их восстановления выполняли с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра модели LCMS-2020 (Shimadzu, Япония) с ионизацией электрораспылением и квадрупольным детектором (регистрация положительных и отрицательных ионов с m/z в диапазоне 50—2000). Напряжение электрораспыления составляло 4.5 кВ, а температуры линии десольватирования и нагревательного блока — 250 и 400°C соответственно. В качестве распылительного и осушающего газа использовали азот (99.5%), подвижная фаза — ацетонитрил (99.9 + %, Chem-Lab) со скоростью потока 0.4 мл/мин. Объем анализируемой пробы — 0,5 мкл.

In situ спектроскопия ЯМР. В ампулу с завинчивающейся крышкой и септой помещали комплекс I (10 мкмоль, 7.7 мг), аскорбиновую кислоту (20 мкмоль, 3.6 мг), 550 мкл CD_3CN и 3 мкл дибромметана (внутренний стандарт). Далее ампулу замораживали в жидком азоте, вакуумировали и заполняли аргоном.

Для исходной смеси регистрировали спектр ЯМР ^1H при температуре 40°C на спектрометре Bruker Avance 300 с рабочей частотой для протонов 300.15 МГц. Значения химических сдвигов (δ , м.д.) определяли относительно остаточного сигнала растворителя (^1H 1.94 м.д. для CD_3CN). Использовали следующие параметры регистрации: диапазон спектра — 150 м.д., время регистрации — 0.2 с, длительность релаксационной задержки — 0.6 с, длительность импульса — 9.5 мкс, количество накоплений — 32. Полученные спады свободной индукции обрабатывали для увеличения соотношения сигнал/шум с помощью экспоненциального взвешивания с коэффициентом до 1. Затем через септу с помощью шприца добавляли 150 мкл D_2O , смесь встряхивали до полного растворения аскорбиновой кислоты. Дальнейшую регистрацию спектров ЯМР проводили каждые 2 мин в течение 40 мин при температуре 40°C с использованием параметров, как при регистрации спектра исходной смеси. Скорость конверсии оценивали по расходу исходного комплекса. Содержание комплекса в смеси (% от исходного) рассчитывали по отношению интегральной интенсивности сигнала протонов дибромметана (5.09 м.д.) к ин-

тегральной интенсивности сигнала мультиплета 8.57—8.68 м.д., выбранного из-за удобства интегрирования, поскольку он наблюдается на всем протяжении восстановления и не перекрывается с другими сигналами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Синтез комплекса кобальта(III) $[\text{Co}(\text{ВірУОМе})_2(\text{esc})]\text{ClO}_4$ (I) проводили в несколько стадий (см. схему 1). На первой стадии 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридин вводили в реакцию комплексообразования с гексагидратом хлорида кобальта(II) [12]. Полученный в результате этого комплекс кобальта(II) $[\text{Co}(\text{ВірУОМе})_2\text{Cl}_2]$ окисляли газообразным хлором, генерируемым при взаимодействии перманганата калия с концентрированной соляной кислотой [13], с образованием комплекса кобальта(III) $[\text{Co}(\text{ВірУОМе})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$. Последующее взаимодействие $[\text{Co}(\text{ВірУОМе})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$ с 6,7-дигидроксикумарином в присутствии триэтиламина и перхлората лития привело к образованию целевого комплекса $[\text{Co}(\text{ВірУОМе})_2(\text{esc})]\text{ClO}_4$ (I), охарактеризованного с помощью масс-спектрометрии (рис. 1) и спектроскопии ЯМР на ядрах ^1H и ^{13}C (рис. 2 и 3).

Для исследования восстановления комплекса I *in situ* с помощью спектроскопии ЯМР применяли разработанный нами ранее подход [11]

с некоторыми изменениями. Для повышения точности оценки содержания комплекса использовали внутренний стандарт. В качестве такого стандарта выбрали дибромметан, так как в его спектре ЯМР ^1H наблюдается один синглет около 5 м.д., который не перекрывается сигналами протонов исследуемого комплекса. В ампулу с завинчивающейся крышкой и септой помещали навеску комплекса кобальта(III), 2 эквивалента аскорбиновой кислоты, ацетонитрил- d_3 и дибромметан, замораживали в жидком азоте, вакуумировали и заполняли аргоном. Для исходной смеси регистрировали спектр ЯМР ^1H при температуре 40°C. Затем с помощью шприца через септу в ампулу добавляли дейтерированную воду с последующей регистрацией спектров ЯМР ^1H при температуре 40°C. При добавлении воды аскорбиновая кислота переходила в раствор и инициировалась реакция восстановления. Предполагаемые продукты восстановления представлены на схеме 2.

На рис. 4 приведены спектры ЯМР ^1H , иллюстрирующие динамику процесса восстановления комплекса I аскорбиновой кислотой. В спектрах можно выделить диамагнитную (от 0 до 10 м.д.) и парамагнитную (от 15 до 120 м.д.) области. Первая содержит сигналы исходного комплекса, аскорбиновой кислоты, продукта ее окисления и свободного 6,7-дигидроксикумарина, а вторая —

Рис. 1. Масс-спектр комплекса I с ионизацией электрораспылением, зарегистрированный для положительных ионов.

Рис. 2. Спектр ЯМР ^1H комплекса I в растворе ДМСО- d_6 при комнатной температуре.

Рис. 3. Спектр ЯМР ^{13}C комплекса I в растворе ДМСО- d_6 при комнатной температуре.

Схема 2.

сигналы образующихся комплексов кобальта(II). По мере протекания реакции интенсивность сигналов в диамагнитной области уменьшается, а в парамагнитной, наоборот, увеличивается. Видно, что реакция протекает достаточно медленно, так как интенсивные сигналы в парамагнитной области появляются только спустя 5 сут. Число сигналов в парамагнитной области, их химический сдвиг и интегральная интенсивность соответствуют комплексу [Co(BipyOMe)₃]²⁺, что дополнительно подтверждается масс-спектрометрическим анализом продуктов восстановления. Масс-спектр реакционной смеси, изображенный на рис. 5, содержит интенсивные сигналы с *m/z* 353.8, 590.2 и 526.2, относящиеся к ионам [Co(BipyOMe)₃]²⁺, [Co(BipyOMe)₂(ClO₄)]⁺ и

[Co(BipyOMe)₂Cl]⁺. Появление в масс-спектре аддуктов с хлорид-анионом может быть связано с неполной заменой хлорид-иона на перхлорат при синтезе I из [Co(BipyOMe)₂Cl₂]Cl. Также в масс-спектре реакционной смеси, зарегистрированном для положительных ионов, наблюдается сигнал с *m/z* 680.3, который предположительно можно отнести к комплексу кобальта(II) с окисленной формой аскорбиновой кислоты в качестве одного из лигандов (рис. 5). Таким образом, восстановление комплекса кобальта(III) [Co(BipyOMe)₂(esc)]ClO₄ протекает с образованием комплекса кобальта(II) [Co(BipyOMe)₃](ClO₄)₂ и сопровождается высвобождением молекулы 6,7-дигидроксикумарина. Аналогичный механизм восстановления наблюдался для ком-

Рис. 4. Динамика изменения спектра ЯМР ¹H с течением времени при восстановлении комплекса I аскорбиновой кислотой в атмосфере аргона (спектр зарегистрирован в смеси ацетонитрила-d₃ и дейтерированной воды, 3.7 : 1 об.).

Рис. 5. Масс-спектр продуктов восстановления комплекса I аскорбиновой кислотой, зарегистрированный для положительных ионов.

Рис. 6. Кинетическая кривая расходования комплекса I при восстановлении аскорбиновой кислотой в атмосфере аргона (а) и зависимость логарифма концентрации $\ln c$ комплекса I от времени реакции (б).

плексов кобальта(III) с 6,7-дигидроксикумарином, содержащих бипиридин или фенантролин вместо 4,4'-диметокси-2,2'-бипиридинового лиганда.

На рис. 6 представлена кинетическая кривая для комплекса I при восстановлении аскорбиновой кислотой в атмосфере аргона, полученная при анализе данных *in situ* спектроскопии ЯМР. Видно, что первые 10 мин соответствуют индукционному периоду реакции, когда концентрация исходного комплекса не изменялась. Далее наблюдалось медленное уменьшение количе-

ства исходного комплекса. Через 40 мин после добавления аскорбиновой кислоты конверсия составила ~60%. Зависимость натурального логарифма концентрации исходного комплекса от времени аппроксимируется прямой с коэффициентом достоверности, близким к единице (см. рис. 6). Линейная аппроксимация свидетельствует о первом порядке лимитирующей стадии процесса восстановления комплекса. Вероятнее всего, этой стадией является высвобождение молекулы 6,7-дигидроксикумарина. По тангенсу угла наклона прямой, изображенной на рис. 6, оценена константа скорости процесса восста-

новления комплекса I аскорбиновой кислотой в инертной атмосфере при 40°C, которая составила $5 \times 10^{-4} \text{ с}^{-1}$.

Таким образом, нами был синтезирован новый редокс-активный комплекс кобальта (III) $[\text{Co}(\text{ВирОМe})_2(\text{esc})]\text{ClO}_4$, содержащий в своем составе 2-оксо-2H-хромен-6,7-диолат дианион в качестве одного из лигандов. Исследовано восстановление синтезированного комплекса аскорбиновой кислотой в инертной атмосфере *in situ* с помощью спектроскопии ЯМР. Показано, что при восстановлении происходит высвобождение 6,7-дигидроксикумарина и образование комплекса кобальта(II) состава $[\text{Co}(\text{ВирОМe})_3]^{2+}\text{A}^{2-}$. Лимитирующая стадия процесса восстановления исследованного комплекса имеет первый порядок, а константа скорости этого процесса составляет всего $5 \times 10^{-4} \text{ с}^{-1}$. Низкое значение константы скорости указывает на необходимость оптимизации молекулярной структуры исследованного комплекса для придания ему свойств, обеспечивающих быструю редокс-активируемую доставку лекарственных препаратов в клетки опухоли.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Данные спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии получены с использованием научного оборудования Центра исследования строения молекул ИНЭОС РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации (Госзадание № 075-03-2023-642).

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 21-73-00155).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brown J.M., Giaccia A.J. // *Cancer Res.* 1998. V. 58. P. 1408.
2. Xiong Q., Liu B., Ding M. et al. // *Cancer Lett.* 2020. V. 486. P. 1.
3. Vaupel P., Thews O., HoECKel M. // *Med. Oncology.* 2001. V. 18. P. 243.
4. Ruirui L., Feifei P., Jia C. et al. // *Asian J. Pharmaceutic. Sci.* 2020. V. 15. P. 311.
5. Renfrew A.K. // *Metallomics.* 2014. V. 6. P. 1324.
6. Hall M.D., Failes T.W., Yamamoto N. et al. // *Dalton Trans.* 2007. P. 3983.
7. Palmeira-Mello M.V., Caballero A.B., Ribeiro J.M. et al. // *J. Inorg. Biochem.* 2020. V. 211. P. 111211.
8. Tsitovich P.B., Sperryak J.A., Morrow J.R. // *Angew. Chem. Int. Ed.* 2013. V. 52. P. 13997.
9. Renfrew A.K., O'Neill E.S., Hambley T.W. et al. // *Coord. Chem. Rev.* 2018. V. 375. P. 221.
10. McPherson J.N., Hogue R.W., Akogun F.S. et al. // *Inorg. Chem.* 2019. V. 58. P. 2218.
11. Хакина Е.А., Никовский И.А., Бабакина Д.А. и др. // *Коорд. химия.* 2023. Т. 49. С. 27 (Khakina E.A., Nikovskii I.A., Babakina D.A. et al. // *Russ. J. Coord. Chem.* 2023. V. 49. P. 24).
<https://doi.org/10.1134/S1070328422700105>
12. Vlcek A.A. // *Inorg. Chem.* 1967. V. 6. P. 1425.
13. Ma D.-L., Wu C., Cheng S.-S. et al. // *Int. J. Mol. Sci.* 2019. V. 20. P. 341.

New Cobalt Complex with Dihydroxycoumarin: Synthesis and Kinetics of Its Redox-Activated Dissociation

K. A. Spiridonov^{1,2}, I. A. Nikovskii², E. P. Antoshkina^{2,3}, E. A. Khakina^{2, *}, and Yu. V. Nelyubina²

¹Moscow State University, Moscow, Russia

²Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

³Moscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudnyi, Moscow oblast, Russia

*e-mail: khakina90@ineos.ac.ru

A new redox-active cobalt(III) complex containing the 2-oxo-2H-chromene-6,7-diolate dianion and 4,4'-dimethoxy-2,2'-bipyridine as ligands is synthesized. The reduction of the synthesized complex with ascorbic acid in an inert atmosphere is studied *in situ* by NMR spectroscopy. The reduction is shown to result in the release of 6,7-dihydroxycoumarin acting as a model drug. This process has the first order with respect to the initial complex.

Keywords: *in situ* nuclear magnetic resonance spectroscopy, dihydroxycoumarin, cobalt complexes, redoxactivated, drug delivery

REFERENCES

1. *Brown J.M., Giaccia A.J.* // *Cancer Res.* 1998. V. 58. P. 1408.
2. *Xiong Q., Liu B., Ding M. et al.* // *Cancer Lett.* 2020. V. 486. P. 1.
3. *Vaupel P., Thews O., Hoeckel M.* // *Med. Oncology.* 2001. V. 18. P. 243.
4. *Ruirui L., Feifei P., Jia C. et al.* // *Asian J. Pharmaceutic. Sci.* 2020. V. 15. P. 311.
5. *Renfrew A.K.* // *Metallomics.* 2014. V. 6. P. 1324.
6. *Hall M.D., Failes T.W., Yamamoto N. et al.* // *Dalton Trans.* 2007. P. 3983.
7. *Palmeira-Mello M.V., Caballero A.B., Ribeiro J.M. et al.* // *J. Inorg. Biochem.* 2020. V. 211. P. 111211.
8. *Tsitovich P.B., Spornyak J.A., Morrow J.R.* // *Angew. Chem. Int. Ed.* 2013. V. 52. P. 13997.
9. *Renfrew A.K., O'Neill E.S., Hambley T.W. et al.* // *Coord. Chem. Rev.* 2018. V. 375. P. 221.
10. *McPherson J.N., Hogue R.W., Akogun F.S. et al.* // *Inorg. Chem.* 2019. V. 58. P. 2218.
11. *Khakina E.A., Nikovskii I.A., Babakina D.A. et al.* // *Russ. J. Coord. Chem.* 2023. V. 49. P. 24.
<https://doi.org/10.1134/S1070328422700105>
12. *Vlcek A.A.* // *Inorg. Chem.* 1967. V. 6. P. 1425.
13. *Ma D.-L., Wu C., Cheng S.-S. et al.* // *Int. J. Mol. Sci.* 2019. V. 20. P. 341.