УДК 547.87

СИНТЕЗ НОВЫХ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АДДУКТОВ НА ОСНОВЕ ТЕТРААЗАДЕКАЛИНА

© 2023 г. Е. Б. Рахимова*, В. Ю. Кирсанов

Институт нефтехимии и катализа – обособленное структурное подразделение
ФГБНУ «Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук» (ИНК УФИЦ РАН),
Россия, 450075 Уфа, просп. Октября, 141
*e-mail: rakhimovaelena@mail.ru

Поступила в редакцию 27.03.2023 г.
После доработки 24.04.2023 г.
Принята к публикации 25.04.2023 г.

Разработан одnoreакторный метод синтеза 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропиренов каталитической гетероциклизацией 2,6-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалина с циклометилирующим реагентом (формальдегид или тетраметилметандиамин) и замещенными анилинами.

Ключевые слова: катализ, гетероциклизация, тетраазадекалин, замещенные анилины, полициклы, пергидропирены

DOI: 10.31857/S0514749223110113, **EDN:** NCWPZC

Интерес к синтезу *N*-полициклов пиренового ряда вызван возможностью их практического использования в качестве соединений с анальгетическими [1], цитотоксическими [2], а также интеркалирующими [3] свойствами. Синтез стереоизомерных тетраазапергидропиренов [4] был осуществлен реакцией 1,4,5,8-тетраазадекалина с метилакрилатом. Гексаазапергидропирены [5] могут быть получены межмолекулярной циклизацией *N,N*-бис(метоксиметил)-*N*-алкиламинов или рециклизацией 1,3,5-трициклоалкил-1,3,5-триазинанов с 1,4,5,8-тетраазадекалином под действием катализаторов на основе солей *d*- и *f*-элементов. Недавно [5] селективно синтезированы 4,9-диметилгексаазапергидропирены, обладающие противомикробной и цитотоксической активностью.

С учетом ранее полученных результатов в области синтеза *N*-полициклов пергидропиренового ряда [5] мы продолжили исследования конденсации соединений, содержащих подвижные атомы водорода, и изучили каталитическую гетероцикли-

зацию изомерных 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов **1**, **2** [6] с формальдегидом и замещенными анилинами. Установили, что взаимодействие *орто*-толуидина с формальдегидом и двукратным избытком региоизомерной смеси 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов (1:1) в присутствии в качестве катализатора $\text{YbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (5 мол %) в условиях ($\text{MeOH-H}_2\text{O}$, 20°C, 3 ч) приводит к селективному образованию 2,7-бис(2-метилфенил)-4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазапергидропирена (**3**) с выходом 51%. Двойной избыток смеси изомерных тетраазадекалинов необходим для соблюдения стехиометрии реакции, поскольку 2,7-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалин не участвует в конденсации. Повышение концентрации катализатора до 10 мол % не приводит к существенному увеличению выхода целевого полицикла.

В оптимальных условиях (5 мол % $\text{YbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 20°C, 3 ч, $\text{MeOH-H}_2\text{O}$) 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалина взаимодействуют с формальдегидом и изомерными *мета*-/*пара*-толуидинами

Схема 1

3, R = 2-CH₃C₆H₄ (51%); **4**, R = 3-CH₃C₆H₄ (42%); **5**, R = 4-CH₃C₆H₄ (63%); **6**, R = 4-OCH₃C₆H₄ (56%).

с селективным образованием 2,7-дизамещенных 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазпергидропиренов **4**, **5** с выходами 42–63% соответственно (схема 1). Гетероциклизация 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов с формальдегидом и *para*-аниридином в присутствии в качестве катализатора 5 мол % YbCl₃·6H₂O приводит к 2,7-бис(4-метоксифенил)-4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазпергидропирену (**6**) с выходом 56%. Попытка вовлечения *орто*- и *мета*-аниридинов в реакцию мультикомпонентной конденсации оказалась безуспешной.

В указанных условиях в качестве основных продуктов реакции образуются 4,9-изомерные гексаазпергидропирены, полученные на основе 2,6-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалина **1**. Индивидуальные соединения **3–6** выпадают из реакционной смеси в осадок. В маточном растворе остаются продукты взаимодействия 2,7-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалина **2** с формальдегидом.

В спектрах ЯМР ¹H соединений **3–6** характеристическими являются две пары дублетных сигналов с геминальной КССВ равной 10 Гц, относящиеся к метиленовым протонам углеродных атомов в положениях Н^{1,6} и Н^{3,8}. В спектрах ЯМР ¹³C соединений **3–6** присутствуют все углеродные сиг-

налы, относящиеся к диметилзамещенному гексаазатетрациклическому каркасу. На селективное образование 4,9-изомера указывает сигнал в области 82.4–82.6 м.д., соответствующий атомам С^{10b} и С^{10c}. Структура всех соединений подтверждается регистрацией молекулярных пиков в масс-спектрах высокого разрешения.

В связи со способностью тетраметилметандиамина образовывать новые С–N связи в каталитическом синтезе гетероциклических соединений [5], мы изучили возможность его использования в качестве циклометилирующего реагента и синтетического эквивалента формальдегида в синтезе 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазпергидропиренов. Конденсацию изомерных тетраазадекалинов **1**, **2** с *N,N,N',N'*-тетраметилметандиамином и замещенными анилинами осуществили в присутствии хлорида никеля (II), как наиболее активного катализатора. Обнаружили, что в условиях (5 мол % NiCl₂·6H₂O, 20°С, 3 ч, MeOH–H₂O) смесь 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов взаимодействует с тетраметилметандиамином и изомерными анилинами с образованием 2,7-дизамещенных 4,9-диметил-2,3а,5а,7,8а,10а-гексаазпергидропиренов **3–6** с незначительными выходами 23–39% (схема 2).

Схема 2

3, R = 2-CH₃C₆H₄ (30%); **4**, R = 3-CH₃C₆H₄ (23%); **5**, R = 4-CH₃C₆H₄ (39%); **6**, R = 4-OCH₃C₆H₄ (32%).

Мы предполагаем, что конденсация тетраазадекалина с выбранными циклометилирующими реагентами включает стадию образования промежуточных гидроксиметил- или диметиламинометилпроизводных [5]. Согласно принципу жёстких и мягких кислот и оснований [7, 8], $\text{YbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ как жесткая кислота Льюиса координируется с атомом кислорода гидроксиметилпроизводного. А шестиводный хлорид Ni (II) как «промежуточная» кислота Льюиса предпочитает координацию с промежуточным *N*-донорным лигандом. Возможный маршрут реакций включает последовательные стадии координации гетероатома с центральным атомом катализатора, нуклеофильное присоединение к образующему карбокатиону и последующую циклизацию с формированием молекулы гексаазепергидропирена.

Мультикомпонентная конденсация 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов с формальдегидом и замещенными анилинами (общая методика). *a.* Смесь исходных соединений: 2.00 ммоль соответствующего анилина в 10 мл MeOH, 0.4 мл (4 ммоль) 37%-ного водного раствора формальдегида, 0.34 г (2 ммоль) 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов **1**, **2** [6] в 5 мл H_2O и 0.019 г (0.05 ммоль) $\text{YbCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ перемешивали 3 ч при комнатной температуре. Образующиеся осадки отфильтровывали, дважды промывали метанолом (2×5 мл) и получали индивидуальные соединения **3–6**, представляющие собой светлые порошкообразные вещества.

Гетероциклизация 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов с *N,N,N',N'*-тетраметилметандиаминном и замещенными анилинами (общая методика). *b.* Реакцию проводили аналогично методу *a*, используя 0.41 г (4 ммоль) тетраметилметандиамина и 0.012 г (0.05 ммоль) $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

4,9-Диметил-2,7-бис(2-метилфенил)декагидро-1*H*,6*H*-2,3*a*,5*a*,7,8*a*,10*a*-гексаазапирен (3). Выход 0.22 г (51%, метод *a*), 0.13 г (30%, метод *b*), т.пл. 242–244°C, элюент – метанол, R_f 0.72. Спектр ЯМР ^1H (CDCl_3), δ , м.д.: 1.06 д (6H, CH_3 , $\text{H}^{11,12}$, J 6.0 Гц), 2.13 т (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{5,10}$, $^3J_{ab}$ 11.0 Гц), 2.30 уш.с (6H, CH_3 , $\text{H}^{7,7'}$), 2.52 д (2H, CH , $\text{H}^{4,9}$; 2H, CH_2 , $\text{H}_b^{5,10}$; J 9.0 Гц), 2.67 уш.с (2H, CH , $\text{H}^{10b,10c}$), 3.42 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{3,8}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 3.48 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{1,6}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 3.92 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{1,6}$, $^2J_{ba}$

10.5 Гц), 4.39 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{3,8}$, $^2J_{ba}$ 10.5 Гц), 7.03 т (2H, CH , $\text{H}^{4,4'}$, J 7.5 Гц), 7.16–7.20 м (4H, CH , $\text{H}^{3,3'}$, $^5,5'$), 7.78 д (2H, CH , $\text{H}^{6,6'}$, J 8.0 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (CDCl_3), δ , м.д.: 16.6 ($\text{C}^{11,12}$), 18.2 ($\text{C}^{7,7'}$), 51.5 ($\text{C}^{4,9}$), 56.0 ($\text{C}^{5,10}$), 69.9 ($\text{C}^{3,8}$), 73.0 ($\text{C}^{1,6}$), 82.6 ($\text{C}^{10b,10c}$), 122.2 ($\text{C}^{6,6'}$), 123.5 ($\text{C}^{4,4'}$), 126.4 ($\text{C}^{5,5'}$), 130.8 ($\text{C}^{3,3'}$), 132.0 ($\text{C}^{2,2'}$), 149.2 ($\text{C}^{1,1'}$). Масс-спектр (HRMS), m/z : 431.2717 [$M - \text{H}$] $^+$. $\text{C}_{26}\text{H}_{35}\text{N}_6$. M 431.2918. Масс-спектр (HRMS), m/z : 433.2872 [$M + \text{H}$] $^+$. $\text{C}_{26}\text{H}_{37}\text{N}_6$. M 433.3074.

4,9-Диметил-2,7-бис(3-метилфенил)декагидро-1*H*,6*H*-2,3*a*,5*a*,7,8*a*,10*a*-гексаазапирен (4). Выход 0.18 г (42%, метод *a*), 0.10 г (23%, метод *b*), т.пл. 244–246°C, элюент – метанол, R_f 0.72. Спектр ЯМР ^1H (CDCl_3), δ , м.д.: 1.15 д (6H, CH_3 , $\text{H}^{11,12}$, J 6.0 Гц), 2.15 т (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{5,10}$, $^3J_{ab}$ 10.5 Гц), 2.34 уш.с (6H, CH_3 , $\text{H}^{7,7'}$), 2.55–2.61 м (2H, CH , $\text{H}^{4,9}$; 2H, CH_2 , $\text{H}_b^{5,10}$), 2.65 уш.с (2H, CH , $\text{H}^{10b,10c}$), 3.35 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{3,8}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 3.41 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{1,6}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 4.38 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{1,6}$, $^2J_{ba}$ 10.5 Гц), 4.74 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{3,8}$, $^2J_{ba}$ 10.5 Гц), 6.74 д (2H, CH , $\text{H}^{4,4'}$, J 7.5 Гц), 6.87–6.91 м (4H, CH , $\text{H}^{2,2'}$, $^6,6'$), 7.16 т (2H, CH , $\text{H}^{5,5'}$, J 8.0 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (CDCl_3), δ , м.д.: 16.6 ($\text{C}^{11,12}$), 21.8 ($\text{C}^{7,7'}$), 51.3 ($\text{C}^{4,9}$), 56.0 ($\text{C}^{5,10}$), 68.4 ($\text{C}^{3,8}$), 72.3 ($\text{C}^{1,6}$), 82.4 ($\text{C}^{10b,10c}$), 115.2 ($\text{C}^{6,6'}$), 118.8 ($\text{C}^{2,2'}$), 121.7 ($\text{C}^{4,4'}$), 128.9 ($\text{C}^{5,5'}$), 138.7 ($\text{C}^{3,3'}$), 149.2 ($\text{C}^{1,1'}$). Масс-спектр (HRMS), m/z : 431.2913 [$M - \text{H}$] $^+$. $\text{C}_{26}\text{H}_{35}\text{N}_6$. M 431.2918. Масс-спектр (HRMS), m/z : 433.3068 [$M + \text{H}$] $^+$. $\text{C}_{26}\text{H}_{37}\text{N}_6$. M 433.3074.

4,9-Диметил-2,7-бис(4-метилфенил)декагидро-1*H*,6*H*-2,3*a*,5*a*,7,8*a*,10*a*-гексаазапирен (5). Выход 0.27 г (63%, метод *a*), 0.17 г (39%, метод *b*), т.пл. 240–242°C, элюент – метанол, R_f 0.71. Спектр ЯМР ^1H (CDCl_3), δ , м.д.: 1.12 д (6H, CH_3 , $\text{H}^{11,12}$, J 6.0 Гц), 2.13 т (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{5,10}$, $^3J_{ab}$ 11.0 Гц), 2.29 уш.с (6H, CH_3 , $\text{H}^{7,7'}$), 2.53–2.58 м (2H, CH , $\text{H}^{4,9}$; 2H, CH_2 , $\text{H}_b^{5,10}$), 2.63 уш.с (2H, CH , $\text{H}^{10b,10c}$), 3.33 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{3,8}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 3.40 д (2H, CH_2 , $\text{H}_a^{1,6}$, $^2J_{ab}$ 10.5 Гц), 4.30 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{1,6}$, $^2J_{ba}$ 10.0 Гц), 4.68 д (2H, CH_2 , $\text{H}_b^{3,8}$, $^2J_{ba}$ 10.5 Гц), 7.01 д (4H, CH , $\text{H}^{2,2'}$, $^6,6'$, J 8.5 Гц), 7.08 д (4H, CH , $\text{H}^{3,3'}$, $^5,5'$, J 8.5 Гц). Спектр ЯМР ^{13}C (CDCl_3), δ , м.д.: 16.6 ($\text{C}^{11,12}$), 20.6 ($\text{C}^{7,7'}$), 51.3 ($\text{C}^{4,9}$), 56.0 ($\text{C}^{5,10}$), 68.8 ($\text{C}^{3,8}$), 72.7 ($\text{C}^{1,6}$), 82.4 ($\text{C}^{10b,10c}$), 118.5 ($\text{C}^{2,2'}$, $^6,6'$), 129.6 ($\text{C}^{3,3'}$, $^5,5'$), 129.7 ($\text{C}^{4,4'}$), 147.0 ($\text{C}^{1,1'}$). Масс-спектр (HRMS), m/z : 431.2924 [$M - \text{H}$] $^+$. $\text{C}_{26}\text{H}_{35}\text{N}_6$.

M 431.2918. Масс-спектр (HRMS), *m/z*: 433.3079 [*M* + *H*]⁺. C₂₆H₃₇N₆. *M* 433.3074.

4,9-Диметил-2,7-бис(4-метоксифенил)декагидро-1*H*,6*H*-2,3*a*,5*a*,7,8*a*,10*a*-гексазапирен (6). Выход 0.26 г (56%, метод *a*), 0.15 г (32%, метод *b*), т.пл. 252–254°C, элюент – метанол, *R*_f 0.75. Спектр ЯМР ¹H (CDCl₃), δ, м.д.: 1.10 д (6*H*, CH₃, H^{11,12}, *J* 5.5 Гц), 2.12 т (2*H*, CH₂, H_a^{5,10}, ³*J*_{ab} 10.5 Гц), 2.51–2.56 м (2*H*, CH, H^{4,9}; 2*H*, CH₂, H_b^{5,10}), 2.62 уш.с (2*H*, CH, H^{10*b*,10*c*}), 3.36 д (2*H*, CH₂, H_a^{3,8}, ²*J*_{ab} 10.5 Гц), 3.41 д (2*H*, CH₂, H_a^{1,6}, ²*J*_{ab} 10.5 Гц), 3.78 уш.с (6*H*, OCH₃, H^{7,7'}), 4.20 д (2*H*, CH₂, H_b^{1,6}, ²*J*_{ba} 10.0 Гц), 4.58 д (2*H*, CH₂, H_b^{3,8}, ²*J*_{ba} 10.0 Гц), 6.84 д (4*H*, CH, H^{2',2'',6',6''}, *J* 8.5 Гц), 7.11 д (4*H*, CH, H^{3',3'',5',5''}, *J* 9.0 Гц). Спектр ЯМР ¹³C (CDCl₃), δ, м.д.: 16.6 (C^{11,12}), 51.4 (C^{4,9}), 55.5 (C^{7,7'}), 56.0 (C^{5,10}), 69.4 (C^{3,8}), 73.4 (C^{1,6}), 82.4 (C^{10*b*,10*c*}), 114.3 (C^{2',2'',6',6''}), 120.6 (C^{3',3'',5',5''}), 143.4 (C^{1',1''}), 154.4 (C^{4',4''}). Масс-спектр (HRMS), *m/z*: 463.2817 [*M* – *H*]⁺. C₂₆H₃₅N₆O₂. *M* 463.2816. Масс-спектр (HRMS), *m/z*: 465.2971 [*M* + *H*]⁺. C₂₆H₃₇N₆O₂. *M* 465.2973.

Одномерные спектры ЯМР ¹H и ¹³C, а также двумерные гомо- (COSY) и гетероядерные (HSQC, HMBC) спектры регистрировали на спектрометре Bruker Avance 500 (500.17 МГц для ядер ¹H, 125.78 МГц для ядер ¹³C) в CDCl₃ по стандартным методикам фирмы Bruker, внутренний стандарт ТМС. Масс-спектры высокого разрешения (HRMS) записаны на приборе («MaXis impact», Bruker) с использованием масс-анализатора (TOF) с ионизацией электрораспылением (ESI). Температуры плавления определяли на приборе РНМК 80/2617. Использованные в работе реактивы приобрели в компаниях Sigma-Aldrich и Acros Organics.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гетероциклизация смеси изомерных 2,6(7)-диметил-1,4,5,8-тетраазадекалинов с формальдегидом или его синтетическим эквивалентом тетраметилметандиамином и замещенными анилинами в присутствии солей переходных металлов и редкоземельных элементов позволяет селективно синтезировать ранее неописанные 2,7-дизамещенные 4,9-диметил-2,3*a*,5*a*,7,8*a*,10*a*-гексазапергидропирены.

БЛАГОДАРНОСТИ

Структурные исследования соединений проведены в Центре коллективного пользования «Агидель» при ИНК УФИЦ РАН. Результаты получены с использованием оборудования ЦКП «Агидель» УФИЦ РАН.

ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Работа выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ ИНК УФИЦ РАН по темам «Мультикомпонентные каталитические реакции в синтезе циклических и ациклических гетероатомных соединений (FMRS-2022-0079), «Природные и синтетические метаболиты, изучение механизмов их действия — перспективные лекарственные средства для медицины» (FMRS-2022-0074).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Рахимова Елена Борисовна, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7908-1354>

Кирсанов Виктор Юрьевич, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0671-6048>

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Andricopolo A.D., Muller L.A., Filho V.C., Cani G.-N.R.J., Yunes R.A. *Farmaco*. **2000**, *55*, 319–321. doi 10.1016/s0014-827x(00)00027-6
- Roknic S., Glavas-Obrovac L., Karner I., Piantanida I., Zinic M., Pavelic K. *Chemotherapy*. **2000**, *46*, 143–149. doi 10.1159/000007269
- Brun A.M., Harriman A. *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 3656–3660. doi 10.1021/ja00036a013
- Antoine M., Bernard H., Kervarec N., Handel H. *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2*. **2002**, *3*, 552–555. doi 10.1039/B109307J
- Kirsanov V.Yu., Rakhimova E.B. *Int. J. Mol. Sci.* **2022**, *23*, 15484. doi 10.3390/ijms232415484
- Muller R., Philipsborn W., Schleifer L., Aped P., Fuchs B. *Tetrahedron*. **1991**, *47*, 1013–1036. doi 10.1016/S0040-4020(01)80940-6
- Pearson R.G. *J. Chem. Educ.* **1968**, *45*, 643–648. doi 10.1021/ed045p643
- Qiu R., Chen Y., Yin S.-F., Xu X., Au C.-T. *RSC Adv.* **2012**, *2*, 10774–10793. doi 10.1039/C2RA21517A

Synthesis of New Polycyclic Adducts Based on Tetraazadecalin

E. B. Rakhimova* and V. Yu. Kirsanov

*Institute of Petrochemistry and Catalysis, Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Sciences,
prosp. Oktyabrya 141, Ufa, 450075 Russia
e-mail: rakhimovaelena@mail.ru

Received March 27, 2023; revised April 24, 2023; accepted April 25, 2023

A one-pot method has been developed for the synthesis of 4,9-dimethyl-2,3a,5a,7,8a,10a-hexaazaperhydropyrenes by catalytic heterocyclization of 2,6-dimethyl-1,4,5,8-tetraazadecalin with a cyclomethylating reagent (formaldehyde or tetramethylmethanediimine) and substituted anilines.

Keywords: catalysis, heterocyclization, tetraazadecalin, substituted anilines, polycycles, perhydropyrenes