УДК 616.092

DOI: <https://doi.org/10.17816/phbn635902>

Кисспептины рыб Kiss1 и Kiss2 модулируют экспрессию генов кортиколиберина и гонадолиберина в структурах головного мозга *Danio rerio*

А.В. Лизунов, А.А. Блаженко, А.С. Комлев, П.Е. Петрова, П.П. Хохлов,
Е.Р. Бычков, П.Д. Шабанов

Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, Россия

АННОТАЦИЯ

Актуальность. Кисспептиновая система мозга играет важную роль в регуляции репродуктивной функции человека и животных. В отличие от млекопитающих в мозге рыб *Danio rerio* экспрессируется 2 типа кисспептинов — Kiss1 и Kiss2. Актуальным является вопрос о роли кисспептинов в гормональной регуляции у рыб.

Цель. Изучить влияние Kiss1 и Kiss2 на экспрессию генов кортиколиберина и гонадолиберина в среднем и промежуточном мозге у *Danio rerio*.

Материалы и методы. Кисспептины Kiss1 и Kiss2 представляют собой олигопептиды длиной 13 и 9 аминокислотных остатков соответственно. Рыбам *Danio rerio* интрацеребровентрикулярно вводили 1 и 4 нг каждого пептида в объеме 1 мкл. Через 1 и 4 ч после введения олигопептидов, у рыб извлекали головной мозг, выделяли средний и промежуточный мозг единым комплексом и исследовали экспрессию генов кортиколиберина и гонадолиберина с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Результаты. При интрацеребровентрикулярном введении кисспептинов Kiss1 и Kiss2 отмечена модуляция экспрессия генов кортиколиберина и гонадолиберина в структурах среднего и промежуточного мозга *Danio rerio*. В группе, которой вводили Kiss1 в дозе 4 нг, через 4 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с контрольными группами в 17 и 65 раз. В группе, которой вводили Kiss2 в дозе 1 нг, через 1 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с контрольными группами в 23 и 92 раза. В группе, которой вводили Kiss1 в концентрации 4 нг, через 1 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась в 3 раза по сравнению с контрольной группой, забитой через 1 час. В группе, которой вводили Kiss2 в концентрации 1 нг, через 1 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с контрольной группой в 4 раза. В группе, которой вводили Kiss2 в концентрации 1 нг, через 4 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с контрольной группой в 3 раза.

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о том, что введение кисспептинов костистых рыб Kiss1 и Kiss2 приводит к активации гена кортиколиберина и подавлению активности гена гонадолиберина в структурах головного мозга рыб *Danio rerio*.

Ключевые слова: *Danio rerio*; Kiss1; Kiss2; кортиколиберин; гонадолиберин.

Как цитировать

Лизунов А.В., Блаженко А.А., Комлев А.С., Петрова П.Е., Хохлов П.П., Бычков Е.Р., Шабанов П.Д. Кисспептины рыб Kiss1 и Kiss2 модулируют экспрессию генов кортиколиберина и гонадолиберина в структурах головного мозга *Danio rerio* // Психофармакология и биологическая наркология. 2024. Т. 15, № 4. С. 355–362. DOI: <https://doi.org/10.17816/phbn635902>

DOI: <https://doi.org/10.17816/phbn635902>

Kisspeptins Kiss1 and Kiss2 in fish modulate corticoliberin and gonadoliberin gene expression in brain structures of *Danio rerio*

Aleksey V. Lizunov, Aleksandra A. Blazhenko, Aleksey S. Komlev, Polina E. Petrova, Platon P. Khokhlov, Eugeny R. Bychkov, Petr D. Shabanov

Institute of Experimental Medicine, Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT

BACKGROUND: The kisspeptin system in the brain is crucial for regulating reproductive functions in humans and animals. In contrast to mammals, the brains of *Danio rerio* express two types of kisspeptins — Kiss1 and Kiss2. The role of these kisspeptins in hormonal regulation in fish remains an important area of investigation.

AIM: To examine the effects of Kiss1 and Kiss2 on corticoliberin and gonadoliberin gene expression in the midbrain and diencephalon of *Danio rerio*.

MATERIALS AND METHODS: Kisspeptins Kiss1 and Kiss2 are oligopeptides consisting of 13 and 9 amino acid residues, respectively. *Danio rerio* fish were administered intracerebroventricular injections of 1 ng and 4 ng of each peptide at 1 µL volumes. At 1 and 4 hours post-administration, the fish brains were extracted, and the midbrain and diencephalon were isolated as a single complex. Gene expression levels of corticoliberin and gonadoliberin were analyzed using real-time polymerase chain reaction (PCR).

RESULTS: Intracerebroventricular administration of Kiss1 and Kiss2 significantly modulated corticoliberin and gonadoliberin gene expression in the midbrain and diencephalon of *Danio rerio*. In the group injected with 4 ng of Kiss1, *corticoliberin* gene expression increased 17- and 65-fold after 4 hours compared to the control groups. In the group administered 1 ng of Kiss2, *corticoliberin* gene expression increased by 23- and 92-fold compared to the control groups after 1 hour. In the group administered 4 ng of Kiss1, *gonadoliberin* gene expression decreased threefold compared to the control group euthanized at 1 hour. In the group administered 1 ng of Kiss2, *gonadoliberin* gene expression decreased fourfold compared to the control group after 1 hour. In the group administered 1 ng of Kiss2, *gonadoliberin* gene expression decreased threefold compared to the control group after 4 hours.

CONCLUSION: The experimental results reveal that Kiss1 and Kiss2 kisspeptins in *Danio rerio* stimulate corticoliberin gene expression while suppressing gonadoliberin gene expression in the midbrain and diencephalon.

Keywords: *Danio rerio*; Kiss1; Kiss2; corticoliberin; gonadoliberin.

To cite this article

Lizunov AV, Blazhenko AA, Komlev AS, Petrova PE, Khokhlov PP, Bychkov EuR, Shabanov PD. Kisspeptins Kiss1 and Kiss2 in fish modulate corticoliberin and gonadoliberin gene expression in brain structures of *Danio rerio*. *Psychopharmacology and biological narcology*. 2024;15(4):355–362. DOI: <https://doi.org/10.17816/phbn635902>

Received: 10.09.2024

Accepted: 13.11.2024

Published online: 28.12.2024

АКТУАЛЬНОСТЬ

Кисспептиновая система мозга играет важную роль в регуляции репродуктивной функции человека и животных. Кисспептин оказывает активирующее влияние на гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось посредством стимуляции секреции гипоталамического гонадотропин-рилизинг гормона [1]. Кисспептин у человека кодируется геном *Kiss1*, его продукт — белок длиной 145 аминокислотных остатков. Активные формы кисспептина представлены короткими пептидами длиной 54, 14, 13 и 10 аминокислотных остатков. Они взаимодействуют с рецептором кисспептина KISS1R.

В настоящее время для оценки фармакологической активности новых соединений в качестве модельного организма часто используются рыбы *Danio rerio*. В отличие от млекопитающих в мозге рыб *Danio rerio* экспрессируется 2 типа кисспептинов Kiss1 и Kiss2. Пептид Kiss1 рыб является ортологом Kiss1 млекопитающих, но в отличие от млекопитающих он не регулирует функцию гонад, а блокирует проявления страха и активирует исследовательское поведение у рыб [2]. В то же время пептид Kiss2 связан с регуляцией репродуктивной функции у рыб и синтезируется в перивентрикулярной области гипоталамуса. Введение Kiss2, но не Kiss1, увеличивало экспрессию генов фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов в гипофизе у самок *Danio rerio* [3].

Гонадотропин-рилизинг гормона продуцируется в гипоталамусе и вызывает усиление секреции фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов передней доли гипофиза. Активность гонадотропин-рилизинг гормона также коррелирует с половым и социальным поведением у рыб. Показано, что циклиды с повышенной экспрессией гонадотропин-рилизинг гормона проявляют повышенную склонность к доминантному поведению [1, 4]. Гонадотропин-рилизинг гормон кодируется геном *GNRH1* у человека и геном *gnrh3* у рыб *Danio rerio*.

Кортикотропин-рилизинг гормон регулирует активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Кортиколиберин стимулирует секрецию адренокортикотропного гормона из передней доли гипофиза. Он синтезируется главным образом в паравентрикулярном ядре гипоталамуса и кодируется геном *CRH* у человека и геном *crh* у рыб *Danio rerio*. Кортикотропин-рилизинг гормон принимает участие в реакции организма на стресс и является одним из пусковых механизмов развития тревоги, страха, беспокойства, приводящих к ухудшению аппетита, сна и снижению половой активности. Показаны тесные морфофункциональные связи между кортиколиберин-содержащими и кисспептиновыми нейронами. В одной из первых работ, связанных с влиянием гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы на кисспептин, было высказано предположение о том, что острый и хронический стрессы приводят к снижению уровня кисспептина и подавлению синтеза и секреции лютеинизирующего гормона гипофиза [1, 5, 6].

Цель исследования — изучение влияния интрацеребровентрикулярного введения кисспептинов Kiss1 и Kiss2 рыб *Danio rerio* на экспрессию генов гонадотропин-рилизинг гормона и кортикотропин-рилизинг гормона в среднем и промежуточном мозге у *Danio rerio*.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выбор экспериментальных животных (*Danio rerio*) и условия их содержания были подробно описаны ранее [7]. Анестезию животных и получение образцов среднего и промежуточного мозга проводили согласно общепринятой методике [8].

Кисспептины рыб *Danio rerio* Kiss1 (NVAYYNLNSFGLRY-NH₂) и Kiss2 (FNYPFGLRF-NH₂) синтезировали по стандартному протоколу с использованием защитных Fmoc-групп в отделе общей патологии и патофизиологии ФГБНУ ИЭМ (Санкт-Петербург) [9].

В ходе эксперимента животные были разделены на 10 групп: 1 — контроль 1, животным интрацеребровентрикулярно вводили физиологический раствор в объеме 1 мкл и забивали через 1 ч после инъекции; 2 — контроль 2, животным интрацеребровентрикулярно вводили физиологический раствор в объеме 1 мкл и забивали через 4 ч после инъекции; 3 — животным интрацеребровентрикулярно вводили Kiss1 в дозе 1 нг (1 мкг/мл) и забивали через 1 ч; 4 — животным интрацеребровентрикулярно вводили Kiss1 в дозе 1 нг (1 мкг/мл) и забивали через 4 ч; 5 — животным интрацеребровентрикулярно вводили Kiss1 в дозе 4 нг (4 мкг/мл) и забивали через 1 ч; 6 — животным интрацеребровентрикулярно вводили препарат Kiss1 в дозе 4 нг (4 мкг/мл) и забивали через 4 ч; 7 — животным интрацеребровентрикулярно вводили Kiss2 в дозе 1 нг (1 мкг/мл) и забивали через 1 ч; 8 — животным интрацеребровентрикулярно вводили препарат Kiss2 в дозе 1 нг (1 мкг/мл) и забивали через 4 ч; 9 — животным интрацеребровентрикулярно вводили Kiss2 в дозе 4 нг (4 мкг/мл) и забивали через 1 ч; 10 — животным интрацеребровентрикулярно вводили препарат Kiss2 в дозе 4 нг (4 мкг/мл) и забивали через 4 ч. Все внутримозговые инъекции проводили в объеме 1 мкл.

Для оценки экспрессии генов кортиколиберина и гонадолиберина через 1 и 4 ч после введения Kiss1 и Kiss2 у рыб извлекали головной мозг, выделяли средний и промежуточный мозг единым комплексом с последующим получением мРНК по стандартной методике. Измельченный фрагмент головного мозга помещали в 100 мкл тризола и инкубировали 5 мин при температуре 40 °С. Затем к каждой пробе добавляли по 40 мкл хлороформа, перемешивали и инкубировали 5 мин с плавным перемешиванием. Затем центрифугировали 10 мин при 13 000 g, отбирали верхнюю фазу. После этого к отобранной верхней фазе добавляли равный объем изопропилового спирта, перемешивали и инкубировали сутки при –20 °С. Затем центрифугировали 10 мин

при 13 000 g, собирая осадок. Удаляли спирт, промывали осадок 70 % этиловым спиртом и высушивали в термостате при 40 °C. Высушенный осадок растворяли в 50 мкл dH₂O с добавлением 1 % РНАзина. После выделения мРНК проводили реакции обратной транскрипции. После проводили реакции ПЦР в реальном времени с праймерами к мРНК генов кортикотропин-рилизинг гормона *Corticoliberin* (JN859047.1) и гонадотропин-рилизинг гормона *Gonadoliberin* (AJ304429.1), в качестве референсных генов были взяты гены домашнего хозяйства циклофилина (*Cyclophilin*) и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (*Glyceraldehyde-3-phosphatedehydrogenase* (*Gapdh*)). Уровень экспрессии генов кортиколиберина и гонадолиберина нормировали к уровню среднего геометрического двух референсных генов (*Cyclophilin* и *Gapdh*) и рассчитывали в относительных единицах по отношению к средней величине экспрессии генов кортиколиберина и гонадолиберина в группах соответственно.

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью стандартного пакета программ Graph Pad PRISM 8.0. Для определения соответствия формы распределения нормальному применяли критерий Колмогорова – Смирнова. В случаях нормального распределения обработку данных проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA с последующим попарным сравнением экспериментальных групп по критерию Тьюки. В случаях неизвестного распределения использовали непараметрический критерий Краскела – Уоллиса с последующим сравнением независимых групп в тесте Данна. Различия считали статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень мРНК гена *Corticoliberin* в среднем и промежуточном мозге *Danio rerio* продемонстрировал следующие показатели. В КГ, через 1 ч после инъекции, экспрессия гена *Corticoliberin* была в 4 раза выше по сравнению с КГ, взятой через 4 ч после введения физиологического раствора. В группе 3 через 1 ч экспрессия гена *Corticoliberin* была снижена по сравнению с КГ (4 ч). В группах 4 и 5 через 1 ч экспрессия гена *Corticoliberin* значительно не отличалась от обеих КГ. В группе 6 через 4 часа экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с обеими КГ

в 17 и 65 раз соответственно. В группе 7 через 1 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с обеими КГ в 23 и 92 раз соответственно. В группе 8 через 4 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с обеими КГ в 17 и 64 раза соответственно. В группе 9 через 1 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с обеими КГ в 41 и 167 раз соответственно. В группе 10 через 4 ч экспрессия гена *Corticoliberin* повысилась по сравнению с обеими КГ в 19 и 75 раз соответственно. Данные представлены на рисунке 1.

Уровень мРНК гена *Gonadoliberin* в среднем и промежуточном мозге *Danio rerio* продемонстрировал следующие показатели. В КГ, забитой через 1 ч после введения физиологического раствора, экспрессия гена *Gonadoliberin* была выше в 3 раза, чем в КГ, забитой через 4 ч. В группах, которым вводили интрацеребровентрикулярно кисспептин 1 и 2 в концентрациях 1 нг, через 1 и 4 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* значительно не отличалась от обеих КГ. В группе, которой вводили интрацеребровентрикулярно кисспептин 1 в концентрации 4 мкг/мл, через 1 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась в 3 раза по сравнению с КГ, забитой через 1 ч. В группе 6 через 4 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с КГ (1 ч) в 1,2 раза. В группе 7 через 1 час экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с КГ, забитой через 1 час, в 4 раза. В группе 8 через 4 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с КГ, забитой через 4 ч, в 3 раза. В группе 9 через 1 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с КГ, забитой через 1 ч, в 3 раза. В группе 10 через 4 ч экспрессия гена *Gonadoliberin* понизилась по сравнению с КГ, забитой через 4 ч, в 2,4 раза. Данные представлены на рисунке 2.

В предыдущих поведенческих экспериментах было показано, что различные виды стресса вызывают развитие тревожности у представителей костистых рыб [2]. Установлено, что это связано с повышением уровня кортиколиберина и гонадолиберина в головном мозге исследуемых животных [2, 11] Регуляция синтеза пептидов происходит как на стадии экспрессии генов пептидов, так и на посттрансляционном уровне. В связи с этим, при изучении механизмов действия препаратов, снимающих стрессорное состояние, необходимо изучить изменение в уровне экспрессии генов пептидов, связанных с развитием стресса. Препараты кисспептинов ранее были изучены

Таблица 1. Последовательность праймеров

Table 1. Primer Sequence

Ген	Последовательность праймеров	
	Прямой (5'-3')	Обратный (3'-5')
<i>Cyclophilin</i>	AGCATCCGCAAAACGGAAAAG	CCCTGTAGCCATAGCCAGG
<i>Gapdh</i>	GATACACGGAGCACCAGGTT	GCCATCAGGTCACATACAGC
<i>Corticoliberin</i>	GGTAACGGGATCCTGAGCAG	ATGATCTTGGGTTGTGGGT
<i>Gonadoliberin</i>	CACTGGTCATACGGTTGGCT	GCAAACCTTCAGCATCCACC

как антистрессорные [12]. В данной работе было установлено, что введение пептида Kiss2 рыбам вида *Danio rerio* повышает уровень экспрессии гена кортиколиберина и одновременно снижает уровень экспрессии гена гонадотропин-рилизинг-гормона в мозгу исследуемых рыб. При этом другой пептид Kiss1 оказывал значимое влияние на повышение уровня экспрессии гена кортиколиберина

и снижение уровня экспрессии гена гонадотропин-рилизинг-гормона только при увеличении концентрации и времени экспозиции. Это может говорить о том, что разные кисспептины активируют различные сигнальные пути в нервных клетках, что и приводит к оказанию различного воздействия на гены-мишени. Ранее было показано, что кортикотропин-рилизинг-гормон задействован

Рис. 1. Экспрессия гена кортиколиберина в среднем и промежуточном мозге *Danio rerio*. * — $p < 0,05$, *** — $p < 0,001$ по отношению к группе контроля, забитой через 1 час; ### — $p < 0,001$ по отношению к группе контроля, забитой через 4 часа. Данные выражены в условных единицах и нормированы к уровню экспрессии генов циклофилина (*Cyclophilin*) и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (*Gapdh*) и рассчитаны в относительных единицах по отношению к средней величине экспрессии гена *Corticotiberin* в группах. Выравнивание производилось по среднему геометрическому двух референсных генов (*Cyclophilin* и *Gapdh*). Данные представлены как среднее $\pm$ стандартная ошибка среднего

Fig. 1. Corticotiberin gene expression in the midbrain and diencephalon of *Danio rerio*. * — $p < 0.05$, *** — $p < 0.001$ relative to the control group euthanized after 1 hour; ### — $p < 0.001$ relative to the control group euthanized after 4 hours. Data are presented in arbitrary units normalized to the expression levels of *Cyclophilin* and *Gapdh* genes and calculated relative to the mean *corticotiberin* expression in the groups. The alignment was performed using the geometric mean of the reference genes (*Cyclophilin* and *Gapdh*). Data are presented as mean $\pm$ standard error of the mean ($M \pm SEM$)

Рис. 2. Экспрессия гена гонадолиберина в среднем и промежуточном мозге *Danio rerio*. ** — $p < 0,01$, *** — $p < 0,001$ по отношению к группе контроля, забитой через 1 час; ## — $p < 0,01$, ### — $p < 0,001$ по отношению к группе контроля, забитой через 4 ч. Данные выражены в условных единицах и нормированы к уровню экспрессии генов циклофилина (*Cyclophilin*) и глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (*Gapdh*) и рассчитаны в относительных единицах по отношению к средней величине экспрессии гена *Gonadoliberin* в группах. Выравнивание производилось по среднему геометрическому двух референсных генов (*Cyclophilin* и *Gapdh*). Данные представлены как среднее $\pm$ стандартная ошибка среднего

Fig. 2. Gonadoliberin gene expression in the midbrain and diencephalon of *Danio rerio*. ** — $p < 0.01$, *** — $p < 0.001$ relative to the control group euthanized after 1 hour; ## — $p < 0.01$, ### — $p < 0.001$ relative to the control group euthanized after 4 hours. Data are presented in arbitrary units normalized to the expression levels of *Cyclophilin* and *Gapdh* genes and calculated relative to the mean *gonadoliberin* expression in the groups. The alignment was performed using the geometric mean of the reference genes (*Cyclophilin* and *Gapdh*). Data are presented as mean $\pm$ standard error of the mean ($M \pm SEM$)

в ответе на развитие тревожности при стрессе [6]. Также ранее было показано, что гонадотропин-рилизинг-гормон играет важную роль в активации полового и территориального поведения у рыб, которое связано со стрессом [4]. В связи с этим препарат, активирующий ген кортиколиберина, одновременно репрессирует ген гонадолиберина в мозгу рыб *Danio rerio*. Нужно отметить, что этот эффект на уровне клеточного сигналинга может возникать из-за связи различных кисспептинов с разными компонентами сигнального каскада. Разнонаправленность эффектов на экспрессию генов *Corticoliberin* и *Gonadoliberin* согласуется с данными предыдущих исследований [13, 14]. Неоднократно было показано, что регуляция через сигнальные каскады у человека и других видов животных может работать прямо противоположно [15, 16]. В связи с этим можно ожидать, что в опытах на культуре человеческих клеток, в отличие от рыб, регуляция экспрессии генов *CRH* и *GNRH1* препаратами кисспептинов будет не разнонаправлена, а сонаправлена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют расширить современные представления о механизмах действия препаратов кисспептинов, а также открывают перспективы для их дальнейшего изучения как потенциальных антистрессорных препаратов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вклад авторов. Все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку

статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией. Вклад каждого автора: А.В. Лизунов — проведение экспериментов по ОТ ПЦР, А.А. Блаженко — проведение экспериментов по введению препаратов интрацеребрально, препарирование животных, А.С. Комлев, П.Е. Петрова — анализ данных, П.П. Хохлов — разработка общей концепции, написание статьи, Е.Р. Бычков — анализ данных, написание статьи, П.Д. Шабанов — разработка общей концепции.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источники финансирования. Исследование выполнено в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Минобрнауки России.

ADDITIONAL INFORMATION

Authors' contributions. All authors made significant contributions to the conception, conduct of the study and preparation of the article, and read and approved the final version before publication. Contribution of each author: A.V. Lizunov — conducting RT-PCR experiments, A.A. Blazhenko — conducting experiments on intracerebral administration of drugs, dissecting animals, A.S. Komlev, P.E. Petrova — data analysis, P.P. Khokhlov — development of the general concept, writing the article, E.R. Bychkov — data analysis, article writing, P.D. Shabanov — development of the general concept.

Conflict of interest. The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Sources of funding. The study was carried out within the framework of the state task of the Institute of Experimental Medicine, Ministry of Education and Science of Russia.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нужнова А.А., Костина М.И., Блаженко А.А. Динамика кортизола у рыб *Danio rerio* под воздействием синтетического аналога кисспептина 1 // Биомедицинская химия. 2024. Т. 70, № 3. С. 176–179. EDN: DLZZNG doi: 10.18097/PBMC20247003176
2. Ogawa S., Nathan F.M., Parhar I.S. Habenular kisspeptin modulates fear in the zebrafish // Proc Natl Acad Sci U S A. 2014. Vol. 111, N 10. P. 3841–3846. doi: 10.1073/pnas.1314184111
3. Kitahashi T., Ogawa S., Parhar I.S. Cloning and expression of kiss2 in the zebrafish and medaka // Endocrinology. 2009. Vol. 150, N 2. P. 821–831. doi: 10.1210/en.2008-0940
4. Chee S.S., Espinoza W.A., Iwaniuk A.N., et al. Social status, breeding state, and GnRH soma size in convict cichlids (*Cryptoheros nigrofasciatus*) // Behav Brain Res. 2013. Vol. 237. P. 318–324. doi: 10.1016/j.bbr.2012.09.023
5. Daviu N., Bruchas M.R., Moghaddam B., et al. Neurobiological links between stress and anxiety. *Neurobiol Stress*. 2019. Vol. 11. P. 100191. doi: 10.1016/j.ynstr.2019.100191
6. Khokhlov P.P., Bayramov A.A., Blazhenko A.A., et al. Peptide signalling systems of bony fish as a new molecular model for experimental neuropharmacology // Bulletin of Smolensk State Medical Academy. 2023. Vol. 22, N 1. P. 42–52. EDN: DGHYWC doi: 10.37903/vsgma.2023.1.6
7. Shabanov P.D., Blazhenko A.A., Devyashin A.S., et al. In search of new brain biomarkers of stress // Research Results

in *Pharmacology*. 2021. Vol. 7, N 1. P. 41–46. EDN: IZPGYW doi: 10.3897/rrpharmacology.7.63326

8. Патент РФ на изобретение № 2766689 / 30.12.2020. Блаженко А.А., Хохлов П.П., Лебедев А.А., Шабанов П.Д. Применение лидокаина для анестезии модельного организма *Danio rerio* в экспериментальных условиях. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48140886> Дата обращения: 15.11.2024. EDN: WEGTHB

9. Хохлов П.П., Блаженко А.А., Комлев А.С. и др., Синтетические аналоги пептидов кисспептинов обладают фармакологическими свойствами природных пептидов // *Экспериментальная и клиническая фармакология*. 2023. Т. 86, № 11С. С. 153а. EDN: MOWCYR doi: 10.30906/ekf-2023-86s-153a

10. Vandesompele J., De Preter K., Pattyn F., et al. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR data by geometric averaging of multiple internal control genes // *Genome Biol*. 2002;3(7):RESEARCH0034. doi: 10.1186/gb-2002-3-7-research0034

11. Clarkson J, d'Anglemont de Tassigny X, Moreno AS, et al. Kisspeptin-GPR54 signaling is essential for preovulatory gonadotropin-releasing hormone neuron activation and the luteinizing hormone surge // *J Neurosci*. 2008. Vol. 28, N 35. P. 8691–8697. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1775-08.2008

12. Тиссен И.Ю., Лебедев А.А., Цикунов С.Г., Шабанов П.Д. Кисспептин уменьшает проявления половой дисфункции у крыс в модели посттравматического стрессового расстройства // *Психофармакология и биологическая наркология*. 2023. Т. 14, № 4. С. 237–244. EDN: WVXICW doi: 10.17816/phbn623033

13. Lund J, Chen F, Hua A, et al. Comparative sequence analysis of 634 kb of the mouse chromosome 16 region of conserved synteny with the human velocardiofacial syndrome region on chromosome 22q11.2 // *Genomics*. 2000. Vol. 63, N 3. P. 374–383. doi: 10.1006/geno.1999.6044

14. Stephen S.L., Freestone K., Dunn S., et al. Scavenger receptors and their potential as therapeutic targets in the treatment of cardiovascular disease // *Int J Hypertens*. 2010. Vol. 2010. P. 646929. doi: 10.4061/2010/646929

15. Зарубина И.В., Ганопольский В.П., Александров П.В., Шабанов П.Д. Исследование метеoadаптогенных свойств трекрезана у здоровых добровольцев в условиях холодового воздействия // *Психофармакология и биологическая наркология*. 2007. Т. 7, № 1. С. 1459–1463. EDN: HZUPKR

16. Mineo C. Lipoprotein receptor signalling in atherosclerosis // *Cardiovasc Res*. 2020. Vol. 116, N 7. P. 1254–1274. doi: 10.1093/cvr/cvz338

REFERENCES

1. Needova AA, Kostina MI, Blazhenko AA Dynamics in cortisol levels in danio rerio fish under the influence of a synthetic analog of kisspeptin 1. *Biomedical Chemistry*. 2024;70(3):176–179. EDN: DLZZNG doi: 10.18097/PBMC20247003176

2. Ogawa S, Nathan FM, Parhar IS. Habenular kisspeptin modulates fear in the zebrafish. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2014;111(10):3841–3846. doi: 10.1073/pnas.1314184111

3. Kitahashi T, Ogawa S, Parhar IS. Cloning and expression of kiss2 in the zebrafish and medaka. *Endocrinology*. 2009;150(2):821–831. doi: 10.1210/en.2008-0940

4. Chee SS, Espinoza WA, Iwaniuk AN, et al. Social status, breeding state, and GnRH soma size in convict cichlids (*Cryptoheros nigrofasciatus*). *Behav Brain Res*. 2013;237:318–324. doi: 10.1016/j.bbr.2012.09.023

5. Daviu N, Bruchas MR, Moghaddam B, et al. Neurobiological links between stress and anxiety. *Neurobiol Stress*. 2019;11:100191. doi: 10.1016/j.yjnstr.2019.100191

6. Khokhlov PP, Bayramov AA, Blazhenko AA. et al. Peptide signalling systems of bony fish as a new molecular model for experimental neuropharmacology. *Bulletin of Smolensk State Medical Academy*. 2023;22(1):42–52. EDN: DGHYWC doi: 10.37903/vsgma.2023.1.6

7. Shabanov PD, Blazhenko AA, Devyashin AS, et al. In search of new brain biomarkers of stress. *Research Results in Pharmacology*. 2021;7(1):41–46. EDN: IZPGYW doi: 10.3897/rrpharmacology.7.63326

8. Патент RUS № 2766689 / 30.12.2020. Blazhenko AA, Khokhlov PP, Lebedev AA, Shabanov PD. *Application of lidocaine for anaesthesia of the model organism Danio rerio in experimental conditions*. Available from: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48140886> EDN: WEGTHB

9. Khokhlov PP, Blazhenko AA, Komlev AS, et al, Synthetic analogues of kisspeptin peptides have pharmacologi-

cal properties of natural peptides. *Experimental and Clinical Pharmacology*. 2023;86(11S):153a. (In Russ.) EDN: MOWCYR doi: 10.30906/ekf-2023-86s-153a

10. Vandesompele J, De Preter K, Pattyn F, et al. Accurate normalization of real-time quantitative RT-PCR data by geometric averaging of multiple internal control genes. *Genome Biol*. 2002;3(7):RESEARCH0034. doi: 10.1186/gb-2002-3-7-research0034

11. Clarkson J, d'Anglemont de Tassigny X, Moreno AS, et al. Kisspeptin-GPR54 signaling is essential for preovulatory gonadotropin-releasing hormone neuron activation and the luteinizing hormone surge. *J Neurosci*. 2008;28(35):8691–8697. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1775-08.2008

12. Thyssen IY, Lebedev AA, Tsikunov SG, Shabanov PD. Kisspeptin reduces sexual dysfunction in a rat model of posttraumatic stress disorder. *Psychopharmacology and Biological Narcology*. 2023;14(4):237–244. EDN: WVXICW doi: 10.17816/phbn623033

13. Lund J, Chen F, Hua A, et al. Comparative sequence analysis of 634 kb of the mouse chromosome 16 region of conserved synteny with the human velocardiofacial syndrome region on chromosome 22q11.2. *Genomics*. 2000;63(3):374–383. doi: 10.1006/geno.1999.6044

14. Stephen SL, Freestone K, Dunn S, et al. Scavenger receptors and their potential as therapeutic targets in the treatment of cardiovascular disease. *Int J Hypertens*. 2010;2010:646929. doi: 10.4061/2010/646929

15. Zarubina IV, Ganapolsky VP, Alexandrov PV, Shabanov PD. Study of meteoroadaptogenic properties in healthy volunteers in cold exposure. *Psychopharmacology and Biological Narcology*. 2007;7(1):1459–1463. EDN: HZUPKR

16. Mineo C. Lipoprotein receptor signalling in atherosclerosis. *Cardiovasc Res*. 2020;116(7):1254–1274. doi: 10.1093/cvr/cvz338

ОБ АВТОРАХ

***Алексей Владимирович Лизунов**, канд. биол. наук,
Институт экспериментальной медицины;
адрес: Россия, Санкт-Петербург, 197022, ул. Академика
Павлова, 12; ORCID: 0000-0001-6458-5683;
e-mail: izya12005@yandex.ru

Александра Александровна Блаженко, канд. биол. наук;
ORCID: 0000-0002-8079-0991; eLibrary SPIN 8762-3604;
e-mail: alexandrablazhenko@gmail.com

Алексей Сергеевич Комлев, ORCID: 0000-0001-9111-0755;
eLibrary SPIN: 5921-6703

Полина Евгеньевна Петрова, ORCID: 0000-0002-9138-8076

Платон Платонович Хохлов, канд. биол. наук;
ORCID: 0000-0001-6553-9267; eLibrary SPIN: 8673-7417;
e-mail: platonkh@list.ru

Евгений Рудольфович Бычков, канд. мед. наук;
ORCID: 0000-0002-8911-6805; eLibrary SPIN: 9408-0799;
e-mail: bychkov@mail.ru

Петр Дмитриевич Шабанов, д-р мед. наук, профессор;
ORCID: 0000-0003-1464-1127; eLibrary SPIN: 8974-7477;
e-mail: pdshabanov@mail.ru

AUTHORS INFO

***Aleksey V. Lizunov**, Cand. Sci. (Biology),
Institute of Experimental Medicine;
address: Russia, 197022, Saint Petersburg, Academician
Pavlov st., 12; ORCID: 0000-0001-6458-5683;
e-mail: izya12005@yandex.ru

Alexandra A. Blazhenko, Cand. Sci. (Biology);
ORCID: 0000-0002-8079-0991; eLibrary eLibrary SPIN: 8762-3604;
e-mail: alexandrablazhenko@gmail.com

Aleksey S. Komlev, ORCID: 0000-0001-9111-0755;
eLibrary SPIN: 5921-6703

Polina E. Petrova, ORCID: 0000-0002-9138-8076

Platon P. Khokhlov, Cand. Sci. (Biology);
ORCID: 0000-0001-6553-9267; eLibrary SPIN: 8673-7417;
e-mail: platonkh@list.ru

Eugenii R. Bychkov, Cand. Sci. (Medicine);
ORCID: 0000-0002-8911-6805; eLibrary SPIN: 9408-0799;
e-mail: bychkov@mail.ru

Petr D. Shabanov, MD, Dr. Sci. (Medicine), professor;
ORCID: 0000-0003-1464-1127; eLibrary SPIN: 8974-7477;
e-mail: pdshabanov@mail.ru

* Автор, ответственный за переписку / Corresponding author