DOI: 10.12731/2658-6649-2025-17-2-1115

EDN: WKRCPL

УДК 631.52

Научная статья

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ *GLEDITSIA TRIACANTHOS* L. ПО ЭКСПРЕССИИ ГЕНА *RbCL* И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ISSR-МАРКЕРОВ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА

П.А. Крылов, П.А. Кузьмин

Аннотация

Обоснование. Борьба с опустыниванием является одним из приоритетов в мире. *Gleditsia triacanthos* L. является перспективным видом для защитного лесоразведения так как обладает высокой засухоустойчивостью. Генотипирование *G. Triacanthos* на основе изучения фотосинтетической продуктивности путем оценки экспрессии гена большой субъединицы гена RuBisCo – *RbcL* и привязки к ISSR ранее не проводилось.

Цель. Провести генотипирование особей популяции *G. Triacanthos* по оценке количественной экспрессии большой субъединицы гена RuBisCo – *RbcL* и их привязки к ISSR-маркерам.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе питомника древесных растений ФНЦ агроэкологии РАН, где были отобраны 10 особей *G. triacanthos* с хорошим жизненным состоянием. Оценка экспрессии *RbcL* проводилась с помощью метода ОТ-ПЦР-РВ. Для изучения генетической структуры исследуемых особей *G. Triacanthos* использовался ISSR-анализ. Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica 12.0 (StatSoft, USA) и POPGENE версии 1.31.

Результаты. По результатам оценки экспрессии *RbcL* были выявлены особи с различной транскрипционной активности, а именно 20% особей *G. Triacanthos* имели высокую экспрессию, 40% умеренную и 40% низкую. В ходе проведения ISSR-анализа были выявлены эффективные праймеры из группы UBC: 836 и 873 у особей *G. Triacanthos*. Генотипирование по ISSR позволило выявить две группы особей *G. Triacanthos* с высокой и низкой экспрессией *RbcL*.

Заключение. Полученные данные могут быть в перспективе использованы в молекулярной селекции *G. Triacanthos* для получения не только устойчивых

к засухе, но и с высокой фотосинтетической продуктивностью для решения задач агролесомелиорации.

Ключевые слова: фотосинтетическая продуктивность; экспрессия генов; *RbcL*; ISSR; *Gleditsia triacanthos* L.; аридные территории

Для цитирования. Крылов, П. А., & Кузьмин, П. А. (2025). Генотипирование *Gleditsia triacanthos* L. по экспрессии гена *RbcL* и с использованием ISSR-маркеров в условиях аридного климата. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 17(2), 82-97. <https://doi.org/10.12731/2658-6649-2025-17-2-1115>

Original article

GENOTYPING OF *GLEDITSIA TRIACANTHOS* L. BASED ON *RBCL* GENE EXPRESSION AND USING ISSR MARKERS IN ARID CLIMATE CONDITIONS

P.A. Krylov, P.A. Kuzmin

Abstract

Background. Fighting against desertification is one of the priorities in the world. *Gleditsia triacanthos* L. is a promising species for afforestation as it has high drought resistance. Genotyping of *G. triacanthos* has not been previously conducted based on the study of photosynthetic productivity by evaluating the expression of the large subunit gene of RuBisCo - *RbcL* and linking it to ISSR markers.

Purpose. To conduct the genotyping of individuals in the *G. triacanthos* population by evaluation the quantitative expression of the large subunit gene of RuBisCo - *RbcL* and their linkage to ISSR markers.

Materials and methods. The study was carried out at the arboretum of the FSC of agroecology RAS, where 10 individuals of *G. triacanthos* in good vital state were selected. The expression of *RbcL* was evaluated using RT-PCR. ISSR analysis was performed to examine the genetic structure of the studied *G. triacanthos* individuals. Statistical analysis of experimental data was performed using the software package Statistica 12.0 (StatSoft, USA) and POPGENE version 1.31.

Results. Based on the results of the *RbcL* expression evaluation, individuals with different transcriptional activity were identified: 20% of *G. triacanthos* individuals had high expression, 40% had moderate expression, and 40% had low expression. Effective primers from the UBC group, 836 and 873, were identified during ISSR analysis in *G. triacanthos* individuals. Genotyping by ISSR revealed two groups of *G. triacanthos* individuals with high and low *RbcL* expression.

Conclusion. The acquired data can potentially be used in molecular breeding of *G. Triacanthos* to obtain not only drought-resistant genotypes, but also genotypes with high photosynthetic productivity to address agroforestry tasks.

Keywords: Photosynthetic productivity; gene expression; *RbcL*; ISSR; *Gleditsia triacanthos* L.; arid areas

For citation. Krylov, P. A., & Kuzmin, P. A. (2025). Genotyping of *Gleditsia triacanthos* L. based on *RbcL* gene expression and using ISSR markers in arid climate conditions. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 17(2), 82-97. <https://doi.org/10.12731/2658-6649-2025-17-2-1115>

Введение

Борьба с деградацией территорий Юга России, в частности опустынивания, является одной из приоритетных задач агролесомелиорации [4; 9]. К самому распространённому и экономически выгодному способу борьбы, из уже существующих, можно отнести создание новых лесозащитных полос. Видовой состав лесозащитных полос может быть очень разнообразным, например, в Волгоградской области с характерным аридным климатом, который включает в себя представителей родов дуб, тополь, ясень, сосна и другие виды древесно-кустарниковых растений [3]. Несмотря на большое число аборигенных видов древесных растений под действием неблагоприятных факторов внешней среды, таких как опустынивание, происходит снижение биологического разнообразия [6].

Для поддержания биологического разнообразия используется интродукция видов древесных растений, обладающих высокой продуктивностью или теми или иными хозяйственно-ценными признаками [13]. Одним из перспективных интродуцированных видов древесных растений является *Gleditsia triacanthos* L. (Гледичия трехколючковая), которая используется в агролесомелиорации [1; 7].

Продуктивность древесных растений зависит от функционирования фотосинтетического аппарата [19]. На молекулярно-генетическом уровне хлоропластный ген фермента рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы/ оксигеназы (RuBisCo) отвечает за продуктивность путем участия в регуляции цикла Кальвина и фотодыхания у всех растений, за счет преобразования CO₂ в углеводы [14; 19; 22].

Важным фактором является установление взаимосвязи(-ей) какого-либо признака, в данном исследовании – экспрессии большой субъединицы гена RuBisCo – *RbcL*, с тем или иным маркером. Особенностью

маркер-опосредованного анализа является возможность его проведения на любой стадии онтогенеза древесного растения. Существует широкое разнообразие неспецифических и специфических молекулярно-генетические маркеры, так как: ISSR [9], RAPD [12], и другие [15; 21]. С учетом отсутствия аннотированного генома *G. triacanthos*, несмотря на наличие черновых секвенированных фрагментов, эффективным является использование ISSR-маркеров, так как они являются неспецифическими маркерами мультилокусного типа и обладают более высокой информативностью и часто используются с целью генотипирования [8, 11, 17].

Цель исследования

Провести генотипирование особей популяции *G. Triacanthos* по оценке количественной экспрессии большой субъединицы гена RuBisCo – *RbcL* и их привязки к ISSR-маркерам.

Материалы и методы исследования

Растительный материал. Исследование проводилось на базе кластерных дендрологических коллекций (кадастр №34:34:000000:122 – питомник древесных растений ФНИЦ агроэкологии РАН). Семенная популяция *G. triacanthos* включала 10 взрослых особей на данном участке. Все особи имели хорошее жизненное состояние. Отбор образцов листовой пластинки для изучения экспрессии большой субъединицы гена RuBisCo (*RbcL*) и ISSR-маркеров проводился 18 июля 2023 года с каждой отдельной особи и помещались в фиксирующий раствор IntactRNA (cat: #BC031, Евроген, Россия), после чего транспортировались в лабораторию и хранились при -80°C в течение суток.

Выделение ДНК и РНК. Геномная ДНК экстрагировалась из 50 мг листовой пластинки с использованием модифицированного метода СТАВ с добавлением 0,2% β -меркаптоэтанола [18]. Выделение РНК из листовой пластинки осуществлялось согласно протоколу из коммерческого набора HiPure Plant RNA Mini Kit (Magen, Китай) из 100 мг растительной ткани без использования жидкого азота. Концентрацию и качество (A260/A280) ДНК и РНК в образцах оценивали с помощью флуориметра Qubit 4.0. (Thermo Fisher Scientific Inc., США) и спектрофотометр SpectrostarNano (BMG Labtech, Германия) соответственно.

Оценка количественной экспрессии с помощью ОТ-ПЦР-РВ и скрининг праймеров ISSR. Для оценки экспрессии *RbcL* и выявления ISSR были использованы праймеры, синтезированные ЗАО Евроген, Россия (табл. 1)

Таблица 1.

Наименование и последовательность ISSR праймеров

Наименование	Последовательность	Tm, °C
<i>RbcL</i>	F: CTTGAATGCTACTGCAGGTA	55.1
	R: ATCCCGGCAATAATGAGC	54.8
<i>EF1alpha</i>	F: AACGGTGATGCTGGTATG	60,2
	R: CTCCTTCTTCTCTACATTCTTG	58,8
	Последовательность '5-3'	
<i>UBC807</i>	AGAGAGAGAGAG AGAGT	50.0
<i>UBC808</i>	AGAGAGAGAGAGAGAGC	50.6
<i>UBC811</i>	GAGAGAGAGAGAGAGAC	54.2
<i>UBC823</i>	TCTCTCTCTCTCTCC	50.7
<i>UBC826</i>	ACACACACACACACC	54.7
<i>UBC834</i>	AGAGAGAGAGAGAGAGY	51.5
<i>UBC835</i>	AGAGAGAGAGAGAGAGYC	54.0
<i>UBC836</i>	AGAGAGAGAGAGAGAGYA	51.5
<i>UBC840</i>	GAGAGAGAGAGAGAGAYT	51.5
<i>UBC841</i>	GAGAGAGAGAGAGAGAYC	54.0
<i>UBC873</i>	GACAGACAGACAGACA	50.0
<i>UBC890</i>	VHVGTGTGTGTGTGTGT	50.0

Количественную ОТ-ПЦР-РВ и ISSR-ПЦР проводили на амплификаторе Applied Biosystems QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, США) с использованием коммерческого набора 50X SYBR Green I для ОТ-ПЦР-РВ (cat: #PB025S, Евроген, Россия) и qPCRmix-HS (cat: #PK145L, Евроген, Россия) соответственно, согласно инструкциями производителя в трех технических повторах.

Количественную оценку экспрессии *RbcL* оценивали в программе QuantStudio Design and Analysis Software v1.5.1 (Thermo Fisher Scientific Inc., США) на основе построения стандартной кривой и метода $2^{-\Delta\Delta C_t}$ [23] с нормализацией по экспрессии гена «домашнего хозяйства» *EF1 alpha* в каждом образце. Для избежания недостоверных результатов количественной ПЦР, были поставлены отрицательные контроли без добавления ревертазы. Программа амплификации включала: стадию обратной транскрипции при 55°C в течение 15 мин, инактивация ревертазы при 95°C в течение 1 мин, затем 40 циклов по 20 с при 95°C, 30 с при 56°C и 1 мин при 72°C. Кроме того, стадия кривой плавления была использована для проверки специфичности праймеров.

Программа амплификации для выявления ISSR-маркеров включала: начальную денатурацию при 95°C в течение 10 мин с последующим про-

ведением 40 циклов, 95°C в течение 30 с, температура отжига для различных праймеров при 55°C в течение 30 с и окончательное удлинение при 72°C в течение 4 мин.

Гель-электрофорез. Визуализация результатов ПЦР проводилась путем разделения ПЦР-продуктов в 2% агарозном геле. Размер полос ДНК на геле рассчитывали с использованием ДНК-маркера длиной более 100 п.н. (cat: #NL002, Евроген, Россия). Для окрашивания агарозного геля использовали бромид этидия (Хеликон, Россия). Визуализацию результатов проводили с использованием гель-документирующей системы iBright CL750 Imaging Systems (Thermo Fisher Scientific, США). Частота полиморфизмов и количество полос, продуцируемых каждым праймером, были рассчитаны индивидуально.

Анализ данных. Локусы ISSR оценивались как присутствующие «1» или отсутствующие «0», каждый из которых рассматривался как независимый. Данные были собраны в двоичную матрицу данных 0/1 с использованием MS Excel. Сгенерированные двоичные данные были использованы для расчета характеристик связывания праймера с использованием POPGENE версии 1.31 [Louati, M. 2019].

Количественные данные обрабатывались с помощью программы Statistica 12.0 (StatSoft Inc., USA), где рассчитывались медиана [1-й квартиль, 3-й квартиль]. Для выявления статистически значимой связи между экспрессией *RbcL* и исследуемыми локусами был использован точный критерий Фишера для непараметрической выборки при достоверности $p < 0.05$.

Результаты исследования

По результатам выделения ДНК из всех образцов были получены концентрации от 33.2 до 48.6 нг/мкл с высокими значениями A260/A280. Наилучшее качество, выше 1.8 по соотношению A260/A280, выделенной РНК было обнаружено в пробах с концентрацией выше 15 нг/мкл. Перед постановкой обычной ПЦР и ОТ-ПЦР-РВ все образцы, концентрация которых была свыше 10 нг/мкл, разбавили до этого значения стерильной дистиллированной водой свободной от ДНКаз и РНКаз. Дополнительно для исследования количественной экспрессии *RbcL*, к исследуемым образцам была взята общая проба для построения стандартной кривой. Стандартная кривая содержала 7 разведений и выполнялась в трех технических повторениях, эффективность ПЦР, которой составила 95.09%.

По результатам амплификации была рассчитана количественная экспрессия *RbcL* в листьях исследуемых особей *G. triacanthos*, произрастающих в засушливых условиях (Рис. 1).

Рис. 1. Относительная экспрессия генов *RbcL* у особей *G. triacanthos*.

Данные, полученные с помощью ОТ-ПЦР-РВ позволили определить две особи *G. triacanthos*, чья относительная экспрессия *RbcL* имела наивысшие значения. При этом стоит отметить, что наработка продукта началась на 14 цикле у этих двух особей. У трех особей (3, 8, 9) *G. triacanthos* экспрессия гена составила менее 0,5, что в 7-8 раз меньше по сравнению со 2 и 7 особью (пороговый цикл амплификации 16-17). У остальных пяти особей *G. triacanthos* относительная экспрессия *RbcL* была в диапазоне от 0,5 до 2, что в среднем в 2 раза меньше, чем у 2 и 7 особи.

Для выявления внутривидового генетического разнообразия *G. Triacanthos*. и связи с экспрессией *RbcL* было протестировано 18 ISSR-праймеров. В результате проведенного тестирования было отобрано 12 ISSR-праймеров отличающиеся высокой эффективностью амплификации большого количества фрагментов геномной ДНК. Остальные 6 праймеров не амплифицировались с образцами выделенной геномной ДНК, поэтому были исключены из дальнейших исследований. В результате были получены генетические спектры всех десяти особей *G. Triacanthos* (прил. 2). На основе полученных спектров ампликонов у исследуемых

особей *G. Triacanthos*, было выявлено низкое внутрипопуляционное генетическое разнообразие, которое характеризовалось следующими показателями: общее число аллелей (n_a) – 1.81 ± 0.39 , эффективное число аллелей (n_e) – 1.46 ± 0.36 , генетическое расстояние по Нею (h) – 0.27 ± 0.18 и индекс Шенона (I) – 0.41 ± 0.25 , что говорит о близкородственности деревьев в популяции. Расчет процента полиморфных локусов составил 81.2%.

В результате сопоставления ISSR-локусов исследуемых особей с экспрессией *RbcL* было обнаружено 2 группы по локусам UBC 836, представленных на рисунке (Рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма ампликонов с UBC 836.

Первая группа с условно высокой экспрессией *RbcL* имела размеры локусов UBC 836 250, 350 и 500 п.н. (особи 2, 3, 4, 6, 7), несмотря на наличие третьей особи у которой наблюдалась низкая транскрипционная активность исследуемого гена. Вторая группа, включающая оставшиеся особи с умеренной и низкой экспрессией *RbcL* с размерами локусов UBC 836 250 и 350 п.н.

Частота встречаемости локуса UBC 836 составила 1.00 (250), 0.77 (350), и 0.70 (500) у особей в исследуемой популяции *G. Triacanthos*. По ISSR-праймеру UBC 873 исследуемые особи *G. Triacanthos* также разделились на две группы с высокой и умеренной экспрессией *RbcL*. У первой группы (особи 2, 5, 6, 7), с высокой экспрессией *RbcL* отсутствовали локусы по данному ISSR-праймеру, в то время как во второй группе с умеренной и низкой экспрессией *RbcL* были выявлены следующие локусы в различных комбинациях (прил. 2): 400 (0.05), 450 (0.11), 500 (0.05), 600 (0.22), 800 (0.22), 900 (0.36). По результатам анализа связи с помощью

точного критерия Фишера между экспрессией *RbcL* у разных особей *G. Triacanthos* сгруппированных по локусам по UBC 836 и UBC 873 была показана достоверность 0.004 и 0.0048 соответственно. Это может служить обоснованием использования данных маркеров для выявления высокопродуктивных особей для селекции.

Таким образом, из 18 протестированных ISSR-праймеров, двенадцать являются эффективными для анализа полиморфизма *G. Triacanthos*. Сравнительный анализ генетических структур по полилокусным спектрам продуктов амплификации исследуемых маркеров позволил определить в геноме определенные микросателлитные повторы.

Обсуждение

Полученные результаты показали, что фотосинтетическая продуктивность может очень сильно варьировать между особями в одной популяции [19]. Важным аспектом фотосинтетической продуктивности является комплекс условий произрастания *G. Triacanthos*, которые характеризуются оптимальным сочетанием факторов среды обитания, влияющих на ее жизнедеятельность. Исследуемая популяция *G. Triacanthos* произрастает в условиях засухи, при дефиците влаги в почве, что может оказывать негативное влияние на их водный режим и продуктивность. Также немаловажным является тот факт, что фермент RuBisCo на биохимическом уровне зависит от гидротермического режима, а именно при высокой температуре воздуха, данный фермент может менять свою специфичность связывания O₂ и CO₂ [16].

С целью выявления перспективных особей в популяциях опираются на различные маркеры, среди которых наиболее точными является ДНК-маркеры, связанные с хозяйственно-ценными признаками. При изучении *G. Triacanthos* на геномном уровне в полной мере не представляется возможным так как ядерный и хлоропластный геномы не секвенированы [2]. В связи с этим нам пришлось сделать акцент на использовании неспецифических ДНК-маркеров, а именно ISSR. Комплекс используемых ISSR-маркеров позволил выявить два ISSR-праймера (UBC 836 и 873), которые были информативны в данной популяции и позволили выделить две группы по интенсивности экспрессии *RbcL* среди особей *G. Triacanthos* в данной популяции. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшей селекционно-семеноводческой работы, которая позволит создать более продуктивные формы данного вида для условий почвенной и воздушной засухи [5], способных депонировать большой объем диоксида углерода.

Заключение

Исследование показало, что фотосинтетическая продуктивность особей *G. Triacanthos* внутри одной популяции может значительно различаться, при том, что они произрастают в одинаковых неблагоприятных условиях. По оценке экспрессии большой субъединицы гена RuBisCo было выявлено 2 особи *G. Triacanthos* обладающие высокой экспрессией *RbcL*, 4 особи умеренной и 4 оставшиеся с низкой. Использование ISSR-маркеров позволило выявить различия в локусах UBC 836 и 873 у исследуемых деревьев. Генотипирование с помощью ISSR-маркеров показало возможную связь наличия уникальных комбинаций локусов и степенью экспрессии *RbcL*. В итоге особи *G. Triacanthos* были разделены на две группы с высокой и низкой экспрессией *RbcL*. Полученные результаты исследования могут быть использованы для дальнейшей селекции *G. Triacanthos* обладающих устойчивостью к засухе и высокой фотосинтетической продуктивностью.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследования проведены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № FNFE-2022-0022 «Поиск и управление паттернами экспрессии генов лесных и культурных растений, отвечающих за адаптацию к неблагоприятным факторам внешней среды и продуктивность» и № FNFE-2022-0009 «Поиск селекционно-ценного генетического материала для создания новых генотипов древесно-кустарниковых пород методами молекулярной селекции».

Список литературы

1. Балакина, А. А., Нефедьева, Е. Э., & Ларикова, Ю. С. (2021). Исследование строения и состава семенной оболочки гледичии и некоторых изменений в ее структуре при набухании. *Аграрный вестник Урала*, 206(3), 46-52. <https://doi.org/10.32417/1997-4868-2021-206-03-46-52> EDN: <https://elibrary.ru/BTTYJU>
2. Беляев, А. И., Крылов, П. А., Пугачева, А. М., & Деревщикова, Л. В. (2023). Анализ наличия геномов древесно-кустарниковых растений, используемых в агролесомелиорации южных регионов России. *Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование*, 70(2), 30-42. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2023-02-03> EDN: <https://elibrary.ru/ГТКJCA>
3. Крючков, С. Н., Солонкин, А. В., & Соломенцева, А. С. (2024). Интенсивные приемы выращивания посадочного материала мелкосемянных дре-

- весных видов в условиях полупустыни. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 16(1), 144-163. <https://doi.org/10.12731/2658-6649-2024-16-1-702> EDN: <https://elibrary.ru/VWPTXX>
4. Кулик, К. Н. (2022). Современное состояние защитных лесонасаждений в Российской Федерации и их роль в смягчении последствий засух и опустынивания земель. *Научно-агрономический журнал*, 188(3), 8-13. <https://doi.org/10.34736/FNC.2022.118.3.001.08-13> EDN: <https://elibrary.ru/LWWQFG>
 5. Кулик, К. Н., Беляев, А. И., & Пугачёва, А. М. (2023). Роль защитного лесоразведения в борьбе с засухой и опустыниванием агроландшафтов. *Аридные экосистемы*, 94(1), 4-14. <https://doi.org/10.24412/1993-3916-2023-1-4-14> EDN: <https://elibrary.ru/CSZXWA>
 6. Мартынюк, А. А., Турчин, Т. Я., Чеплянский, И. Я., & Кулик, А. К. (2023). Современное состояние государственных защитных лесных полос степной и полупустынной зон, основные направления их сохранения и реабилитации. *Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование*, 69(1), 78-81. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2023-01-07> EDN: <https://elibrary.ru/TLKSNA>
 7. Мельник, К. А., & Хужахметова, А. Ш. (2022). Особенности плодоношения интродуцированных представителей родового комплекса *Gleditsia* в возрастном аспекте. *Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование*, 68(4), 184-193. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2022-04-21> EDN: <https://elibrary.ru/YWSHZO>
 8. Якушина, Л. Г., & Шхалахова, Р. М. (2021). Эффективность SSR- и ISSR-маркеров для оценки генетического полиморфизма сортов и гибридов хризантемы садовой (*Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey). *Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии*, 20-1, 520-525. <https://doi.org/10.14258/pbssm.2021105>
 9. Abd-Dada, H., Bouda, S., Khachtib, Y., Bella, Y. A., & Haddioui, A. (2023). Use of ISSR markers to assess the genetic diversity of an endemic plant of Morocco (*Euphorbia resinifera* O. Berg). *Journal of Genetic Engineering & Biotechnology*, 21(1), 91. <https://doi.org/10.1186/s43141-023-00543-4> EDN: <https://elibrary.ru/FWMQAY>
 10. Andablo-Reyes, A. D. C., Moreno-Calles, A. I., Cancio-Coyac, B. A., Gutiérrez-Coatecatl, E., Rivero-Romero, A. D., et al. (2023). Agri-silvicultures of Mexican Arid America. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 19(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s13002-023-00612-5> EDN: <https://elibrary.ru/YEMDHA>
 11. Dorogina, O. V., Nuzhdina, N. S., Zueva, G. A., Gismatulina, Y. A., & Vasilyeva, O. Y. (2022). Specific shoot formation in *Miscanthus sacchariflorus* (Po-

- aceae) under different environmental factors and DNA passportization using ISSR markers. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*, 26(1), 22-29. <https://doi.org/10.18699/VJGB-22-04> EDN: <https://elibrary.ru/AAYMFL>
12. Kader, A., Sinha, S. N., & Ghosh, P. (2022). Clonal fidelity investigation of micropropagated hardened plants of jackfruit tree (*Artocarpus heterophyllus* L.) with RAPD markers. *Journal of Genetic Engineering & Biotechnology*, 20(1), 145. <https://doi.org/10.1186/s43141-022-00426-0> EDN: <https://elibrary.ru/EJPWVA>
 13. Kalmykova, E., & Lazarev, S. (2023). Increasing the biodiversity of the dendroflora of sparsely wooded regions by adapted representatives of the genus *Robinia* L. *Agriculture*, 13(3), 695. <https://doi.org/10.3390/agriculture13030695> EDN: <https://elibrary.ru/FVQNPY>
 14. Martin-Avila, E., Lim, Y. L., Birch, R., Dirk, L. M. A., Buck, S., Rhodes, T., et al. (2020). Modifying plant photosynthesis and growth via simultaneous chloroplast transformation of rubisco large and small subunits. *The Plant Cell*, 32(9), 2898-2916. <https://doi.org/10.1105/tpc.20.00288> EDN: <https://elibrary.ru/FJTOLD>
 15. Müller, M., Kües, U., Budde, K. B., & Gailing, O. (2023). Applying molecular and genetic methods to trees and their fungal communities. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 107(9), 2783-2830. <https://doi.org/10.1007/s00253-023-12480-w> EDN: <https://elibrary.ru/VEICHK>
 16. Sharwood, R. E., Ghannoum, O., Kapralov, M. V., Gunn, L. H., & Whitney, S. M. (2016). Temperature responses of Rubisco from Paniceae grasses provide opportunities for improving C3 photosynthesis. *Nature Plants*, 2, 16186. <https://doi.org/10.1038/nplants.2016.186> EDN: <https://elibrary.ru/WVMHWA>
 17. Sheikina, O. V., & Romanov, E. M. (2024). Variability of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) plus trees in the Middle and Upper Volga Region with the use of ISSR markers. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*, 28(2), 148-154. <https://doi.org/10.18699/vjgb-24-17> EDN: <https://elibrary.ru/TVPF50>
 18. Shestibratov, K. A., Baranov, O. Y., Mescherova, E. N., Kiryanov, P. S., Panteleev, S. V., Mozharovskaya, L. V., et al. (2021). Structure and phylogeny of the curly birch chloroplast genome. *Frontiers in Genetics*, 12, 625764. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.625764> EDN: <https://elibrary.ru/SLSAEC>
 19. Tao, Y., Chiu, L.-W., Hoyle, J. W., Dewhirst, R. A., Richey, C., Rasmussen, K., et al. (2023). Enhanced photosynthetic efficiency for increased carbon assimilation and woody biomass production in engineered hybrid poplar. *Forests*, 14(4), 827. <https://doi.org/10.3390/f14040827> EDN: <https://elibrary.ru/WVJMEF>
 20. Xiao, F., Zhao, Y., Wang, X., & Jian, X. (2023). Full-length transcriptome characterization and comparative analysis of *Gleditsia sinensis*. *BMC Genomics*,

- 24(1), 757. <https://doi.org/10.1186/s12864-023-09843-y> EDN: <https://elibrary.ru/FLFRPG>
21. Zhao, Z., Zhang, H., Wang, P., Yang, Y., Sun, H., et al. (2023). Development of SSR molecular markers and genetic diversity analysis of *Clematis acerifolia* from Taihang Mountains. *PLOS ONE*, 18(5), e0285754. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285754> EDN: <https://elibrary.ru/EOIASA>
 22. Zoschke, R., & Bock, R. (2018). Chloroplast translation: structural and functional organization, operational control, and regulation. *Plant Cell*, 30(4), 745-770. <https://doi.org/10.1105/tpc.18.00016> EDN: <https://elibrary.ru/YIIWHJ>

References

1. Balakina, A. A., Nefedieva, E. E., & Larikova, Yu. S. (2021). Study of the structure and composition of the seed coat of *Gleditsia* and some changes in its structure during swelling. *Agrarian Bulletin of the Urals*, 206(3), 46-52. <https://doi.org/10.32417/1997-4868-2021-206-03-46-52> EDN: <https://elibrary.ru/BTTYJU>
2. Belyaev, A. I., Krylov, P. A., Pugacheva, A. M., & Derevshchikova, L. V. (2023). Analysis of the presence of genomes of woody shrub plants used in agroforestry of the southern regions of Russia. *Izvestiya Nizhnevolzhskogo Agrouniversitetskogo Kompleksa: Nauka i Vyshee Professionalnoe Obrazovanie*, 70(2), 30-42. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2023-02-03> EDN: <https://elibrary.ru/TTKJCA>
3. Kryuchkov, S. N., Solonkin, A. V., & Solomentseva, A. S. (2024). Intensive methods for growing seedlings of small-seeded woody species in semi-desert conditions. *Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture*, 16(1), 144-163. <https://doi.org/10.12731/2658-6649-2024-16-1-702> EDN: <https://elibrary.ru/VWPTXX>
4. Kulik, K. N. (2022). Current state of protective plantations in the Russian Federation and their role in mitigating the consequences of droughts and desertification of lands. *Scientific and Agricultural Journal*, 188(3), 8-13. <https://doi.org/10.34736/FNC.2022.118.3.001.08-13> EDN: <https://elibrary.ru/LWWQFG>
5. Kulik, K. N., Belyaev, A. I., & Pugacheva, A. M. (2023). The role of protective afforestation in combating drought and desertification of agricultural landscapes. *Arid Ecosystems*, 94(1), 4-14. <https://doi.org/10.24412/1993-3916-2023-1-4-14> EDN: <https://elibrary.ru/CSZXWA>
6. Martynyuk, A. A., Turchin, T. Ya., Cheplyansky, I. Ya., & Kulik, A. K. (2023). Current state of state protective forest belts of the steppe and semi-desert zones, main directions of their preservation and rehabilitation. *Izvestiya Nizhnevolzhskogo Agrouniversitetskogo Kompleksa: Nauka i Vyshee Professionalnoe Obrazovanie*, 69(1), 78-81. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2023-01-07> EDN: <https://elibrary.ru/TLKSNA>

7. Melnik, K. A., & Khuzakhmetova, A. Sh. (2022). Features of fruiting of introduced representatives of the *Gleditsia* genus complex in terms of age. *Izvestiya Nizhnevolzhskogo Agrouniversitetskogo Kompleksa: Nauka i Vysshee Professionalnoe Obrazovanie*, 68(4), 184-193. <https://doi.org/10.32786/2071-9485-2022-04-21> EDN: <https://elibrary.ru/YWSHZO>
8. Yakushina, L. G., & Shkhalakhova, R. M. (2021). Efficiency of SSR and ISSR markers for assessing genetic polymorphism of varieties and hybrids of garden chrysanthemum (*Chrysanthemum* × *hortorum* Bailey). *Problems of Botany of Southern Siberia and Mongolia*, 20-1, 520-525. <https://doi.org/10.14258/pbssm.2021105>
9. Abd-Dada, H., Bouda, S., Khachtib, Y., Bella, Y. A., & Haddioui, A. (2023). Use of ISSR markers to assess the genetic diversity of an endemic plant of Morocco (*Euphorbia resinifera* O. Berg). *Journal of Genetic Engineering & Biotechnology*, 21(1), 91. <https://doi.org/10.1186/s43141-023-00543-4> EDN: <https://elibrary.ru/FWMQAY>
10. Andablo-Reyes, A. D. C., Moreno-Calles, A. I., Cancio-Coyac, B. A., Gutiérrez-Coatecatl, E., Rivero-Romero, A. D., et al. (2023). Agri-silvicultures of Mexican Arid America. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 19(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s13002-023-00612-5> EDN: <https://elibrary.ru/YEMDHA>
11. Dorogina, O. V., Nuzhdina, N. S., Zueva, G. A., Gismatulina, Y. A., & Vasilyeva, O. Y. (2022). Specific shoot formation in *Miscanthus sacchariflorus* (Poaceae) under different environmental factors and DNA passportization using ISSR markers. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*, 26(1), 22-29. <https://doi.org/10.18699/VJGB-22-04> EDN: <https://elibrary.ru/AAYMFL>
12. Kader, A., Sinha, S. N., & Ghosh, P. (2022). Clonal fidelity investigation of micropropagated hardened plants of jackfruit tree (*Artocarpus heterophyllus* L.) with RAPD markers. *Journal of Genetic Engineering & Biotechnology*, 20(1), 145. <https://doi.org/10.1186/s43141-022-00426-0> EDN: <https://elibrary.ru/EJPWVA>
13. Kalmykova, E., & Lazarev, S. (2023). Increasing the biodiversity of the dendroflora of sparsely wooded regions by adapted representatives of the genus *Robinia* L. *Agriculture*, 13(3), 695. <https://doi.org/10.3390/agriculture13030695> EDN: <https://elibrary.ru/FVQNPY>
14. Martin-Avila, E., Lim, Y. L., Birch, R., Dirk, L. M. A., Buck, S., Rhodes, T., et al. (2020). Modifying plant photosynthesis and growth via simultaneous chloroplast transformation of rubisco large and small subunits. *The Plant Cell*, 32(9), 2898-2916. <https://doi.org/10.1105/tpc.20.00288> EDN: <https://elibrary.ru/FJTOLD>
15. Müller, M., Kües, U., Budde, K. B., & Gailing, O. (2023). Applying molecular and genetic methods to trees and their fungal communities. *Applied Microbi-*

- ology and Biotechnology*, 107(9), 2783-2830. <https://doi.org/10.1007/s00253-023-12480-w> EDN: <https://elibrary.ru/VEICHK>
16. Sharwood, R. E., Ghannoum, O., Kapralov, M. V., Gunn, L. H., & Whitney, S. M. (2016). Temperature responses of Rubisco from Paniceae grasses provide opportunities for improving C3 photosynthesis. *Nature Plants*, 2, 16186. <https://doi.org/10.1038/nplants.2016.186> EDN: <https://elibrary.ru/WVMHWA>
 17. Sheikina, O. V., & Romanov, E. M. (2024). Variability of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) plus trees in the Middle and Upper Volga Region with the use of ISSR markers. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii*, 28(2), 148-154. <https://doi.org/10.18699/vjgb-24-17> EDN: <https://elibrary.ru/TVPFSO>
 18. Shestibratov, K. A., Baranov, O. Y., Mescherova, E. N., Kiryanov, P. S., Panteleev, S. V., Mozharovskaya, L. V., et al. (2021). Structure and phylogeny of the curly birch chloroplast genome. *Frontiers in Genetics*, 12, 625764. <https://doi.org/10.3389/fgene.2021.625764> EDN: <https://elibrary.ru/SLSAEC>
 19. Tao, Y., Chiu, L.-W., Hoyle, J. W., Dewhirst, R. A., Richey, C., Rasmussen, K., et al. (2023). Enhanced photosynthetic efficiency for increased carbon assimilation and woody biomass production in engineered hybrid poplar. *Forests*, 14(4), 827. <https://doi.org/10.3390/f14040827> EDN: <https://elibrary.ru/WVJMEF>
 20. Xiao, F., Zhao, Y., Wang, X., & Jian, X. (2023). Full-length transcriptome characterization and comparative analysis of *Gleditsia sinensis*. *BMC Genomics*, 24(1), 757. <https://doi.org/10.1186/s12864-023-09843-y> EDN: <https://elibrary.ru/FLFRPG>
 21. Zhao, Z., Zhang, H., Wang, P., Yang, Y., Sun, H., et al. (2023). Development of SSR molecular markers and genetic diversity analysis of *Clematis acerifolia* from Taihang Mountains. *PLOS ONE*, 18(5), e0285754. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285754> EDN: <https://elibrary.ru/EOIASA>
 22. Zoschke, R., & Bock, R. (2018). Chloroplast translation: structural and functional organization, operational control, and regulation. *Plant Cell*, 30(4), 745-770. <https://doi.org/10.1105/tpc.18.00016> EDN: <https://elibrary.ru/YPIWHJ>

ВКЛАД АВТОРОВ

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку статьи для публикации.

AUTHOR CONTRIBUTIONS

The authors contributed equally to this article.

ДААННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Крылов Павел Андреевич, канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией геномных и постгеномных технологий

*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения Российской академии наук»
пр-т Университетский, 97, г. Волгоград, 400062, Российская Федерация
krylov-p@vfanc.ru*

Кузьмин Петр Анатольевич, канд. с.-х. наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией молекулярной селекции
*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелио-
раций и защитного лесоразведения Российской академии наук»
пр-т Университетский, 97, г. Волгоград, 400062, Российская Федерация
kuzmin-p@vfanc.ru*

DATA ABOUT THE AUTHORS

Pavel A. Krylov, Cand. Sc. (Biology), Leading Researcher, Head of the Laboratory of Genomic and Postgenomic Technologies
*Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration, and Protective Afforestation RAS
97, Universitetsky pr., Volgograd, 400062, Russian Federation
krylov-p@vfanc.ru
SPIN-code: 9652-7459
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9587-5886>
ResearcherID: V-6884-2017
Scopus Author ID: 57213164834*

Petr A. Kuzmin, Cand. Sc. (Agriculture), Docent, Leading Researcher, Head of the Laboratory of Molecular Breeding
*Federal Scientific Center of Agroecology, Complex Melioration, and Protective Afforestation RAS
97, Universitetsky pr., Volgograd, 400062, Russian Federation
kuzmin-p@vfanc.ru
SPIN-code: 7551-8803
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1303-765X>
ResearcherID: N-4277-2016
Scopus Author ID: 56192995500*

Поступила 25.07.2024
После рецензирования 03.09.2024
Принята 01.10.2024

Received 25.07.2024
Revised 03.09.2024
Accepted 01.10.2024